I S S N 0563 -8461

東水試出版物通刊 No. 326

調査研究要報 No. 172

昭和 57 ・ 58 年度

大規模増殖場開発事業調査報告書

(イセエビ)

昭和 59 年 3 月

東京都水産試験場

正 誤 表

ページ	行	誤	正
目次	IV	実施機関	実施機関
1	IV	//	//
//	上10	江川慎一郎	江川紳一郎
2	下9	武根島	式根島
11	下9	漁具漁法	漁具漁法
17	上5	露出している。著しく・・・	露出している著しく・・・
31	上11	付近で顕著と	付近で梅雨前線が顕著と
36	下6	に位置する。沿岸	に位置する、沿岸
39	上12	$H \frac{1}{3} = 3.52$ 卦	$H \frac{1}{3} = 3.52m$
57	上11	(1964)	(1974)
60	上9	南化	南下
61	上6	明らかになって	明らかになっている。
62	図32	波浮島	波浮港
83	図37	ヒラクサの稚エビ	ヒラクサ中の稚エビ
108	下2	3.16 t	3.30 t
124	下2	3.16 t	3.30 t

目 次

I	地区名	1
II	対象生物	1
III	調査期間	1
IV	実施機関	1
V	事業の目的	1
VI	地区漁業の概況	2
A	一般概要	2
B	漁場概要	5
C	漁業の動向	5
D	増殖対象生物の漁獲状況並びに採捕形態	8
E	漁場の利用形態	11
F	地区漁業者の動向	11
G	流通加工の現状	11
H	他の開発計画との関連	13
VII	調査地区選定の理由	14
VIII	調 査	14
A	環境調査	14
1.	地形及び地質	14
a.	調査概要	14
b.	調査結果と考察	15
1)	位置と地形	15
2)	地 質	17
3)	海底地形	20
4)	砂層厚調査	20
5)	底質分布	24
6)	砂層厚変動結果	27
2.	気 象	29

a. 気温・降水量	29
b. 風向・風速	32
3. 海象	36
a. 水温・塩分	36
b. 波浪	38
c. 流況	39
1) 神津島周辺の流況	39
2) 調査海域の流況	50
4. 環境調査結果要約	55
5. 引用文献	56
B 生物調査	57
1. 対象生物(イセエビ)	57
a. 抱卵期	57
b. フィロゾマ・プエルルス(沖合調査)	58
c. プエルルス・稚エビ(沿岸調査)	61
1) 採集器	62
2) 造礁サンゴ採取	63
3) 寄藻採取	63
4) ヒラクサ採取	63
5) 雑海藻採取	80
6) プエルルス遊泳肢の構造	81
7) 初期稚エビの期数査定	82
8) プエルルス・稚エビの甲長	85
9) プエルルス・稚エビの飼育	85
d. 成エビのすみ場所	86
e. 移動	90
f. 頭胸甲長組成	97
g. 甲長と体重の関係	102
h. 性比	103
i. 資源	106
j. 害敵生物	109

k. 食 性	111
2. 造成漁場の生物相	112
a. 岩 礁 帯	112
b. 砂 地 帯	117
c. ヒラクサ着生状況	119
d. ヒラクサ中の動物	122
3. 生物調査結果要約	124
4. 引用文献	125
C 施設試験	128
Ⅸ 造成に当たりの基本的な考え方	132
A 造成位置の選定理由	132
B 造成手法の考え方	132
C 具体的な造成手法	135

I 地区名

神津島地区（東京都神津島村）

II 対象生物

イセエビ *Panulirus japonicus*(VON SIEBOLD)

III 調査期間

昭和57・58年

IV 実施機関及び担当者

東京都水産試験場大島分場

三村哲夫，斉藤実，斉藤鉄也，◎1 岡村陽一，◎2 米山純夫，武藤光盛，森真朗，小泉正行，
斉藤盛致，有馬孝和，有馬多恵子，江川慎一郎，床枝真吉，河西一彦，竹之内卓夫

東京都水産試験場技術管理部

西村和久

東京都労働経済局農林水産部水産課

松尾英治，佐藤哲二，◎3 井沢良雄，吉浦和彦，細田勤

株式会社パスコ（委託）

（調査協力）

神津島漁業協同組合

V 事業の目的

当地区は、小型漁船による漁業が主体であり、底魚一本釣漁業、曳縄漁業、建切網漁業、突棒漁業、イセエビ刺網漁業及び採貝、採藻漁業等を組合せた周年操業が営まれている。しかし回遊魚については、黒潮流軸の変化に伴ない年変動が大きく、底棲魚類についても近年、魚体の小型化が顕著になっている。そのうえ漁場の遠隔化が生じ燃油等の高騰により漁家経営を圧迫している。

そのため、当地区の漁家経営を安定、向上させて行くには、資源及び漁場を適切な管理のもとに計画生産体制を確立し、生産の増大を図る必要がある。イセエビは、伊豆諸島の磯根資源の中で最も重要な資源であり、当地区における生産量が最も多く年平均23トンと伊豆諸島全体の60%を

◎ とりまとめ責任者，1. 環境調査，2. 生物調査，3. 地区漁業の概況

占め、漁家の重要な収入源となっている。

そこで、地区内でイセエビの生産量が最も多く、管理体制が整備されている神津島に、イセエビの生育に適した環境を土木工法により大規模に造成し、イセエビの増殖をはかり、適切なる漁場管理のもとに漁獲して、漁家の経営の安定を図る。

VI 地区漁業の概況

A 一般概要

1. 地区の位置

東京都は本州のほぼ中央に位置し、東京湾に臨んでいる大市街地でこの市街地の周辺とその西に連なる地域からなる農山村地帯、及び太平洋上に散在する島しょ（伊豆諸島、小笠原諸島）の三つの部分から成っている。

計画地区は島しょ部で、東経139度～140度、北緯30度～35度の間を南北に連なる伊豆諸島のほぼ中央に位置する神津島地区（利島、新島、式根島、神津島）で全島3村が所属し、面積50.01Km²（表-1）で5つの地区漁協がある。

2. 自然条件

本地区は、富士火山帯の海底山脈の山頂部が海上に現われたもので、火山列島を形成し、従って各島とも既してほぼ中央部にかなり高い山を擁し一般的に山地が大部分を占め、海岸線は断崖で湾入部に乏しく、良港に恵まれていない。

地質は火成岩より成り表土は軽髪火山灰土によりおおわれ保水力に乏しい。また河川はほとんど無く、僅かに降雨後溪流をつくる湧水が処々にあって飲料水を供している。

気象は黒潮の影響により冬暖かく夏涼しい典型的海洋気象である。年平均気温は14℃～19℃で、降雪はほとんどないが降水量は年平均2,000mm以上におよび全国的にみても多雨地域である。しかし、天水に依存する度合の高い利島、武根島では渇水の憂き目にあうことも年に2～3回ある。また、雨と共に風の強いのが本地区の特色で平均風速10m/sec以上の日数が年間2/3以上に及び、特に冬期11月の終りから翌年3月上旬にかけて季節風が吹きまくり、海上は荒れ、各島の交通は途絶の状態になることがしばしばある。

また、秋期は台風の進路に当たるため年2～3回の災害はまぬがれない。

3. 社会経済の動向

ア. 人口の推移

本地域における昭和55年度現在の人口は、神津島村2,210人、新島本村3,684人、利島村2,78人となっており総人口6,172人である（表-2）。これは、伊豆諸島の人口

表1 各島の中心位置と面積

島名	位置		東京(35°39' - 139°46')からの 直接距離 Km	面積 Km ²
	北緯	東経		
利島	34° 31	139° 17'	140	4.19
新島	22	16	156	23.44
式根島	18	14	164	3.80
神津島	12	8	178	18.59

表2 地区内人口

地区	項目	年度	総世帯数	人口	0~14	15~24	25~64	65以上
利島村		45	103	251	58	15	128	50
		50	115	274	50	22	144	58
		55	126	278	50	11	174	43
新島村		45	780	2,912	627	351	1,397	537
		50	802	2,945	602	318	1,442	583
		55	875	2,942	616	238	1,641	447
神津島村		45	532	2,081	595	182	985	319
		50	584	2,093	461	276	1,026	330
		55	617	2,210	498	224	1,253	235
式根島		45	211	742	173	47	398	124
		50	217	740	148	46	416	130
		55	249	742	145	39	461	97
計		45	1,626	5,986	1,453	595	2,908	1,030
		50	1,718	6,052	1,261	662	3,028	1,101
		55	1,867	6,172	1,309	512	3,529	822

31,795人の19.4%を占め、東京都の総人口1,162.7千人の0.005%にすぎない。また人口密度は1Km²当たり123.4人であり、全国平均(314.1人)の39%となっている。

昭和45年から55年の10ヶ年における人口動態をみると、3.1%の増加を示し、伊豆諸島全体の4.4%の減少とは異った傾向を示している。これは、就労、就学の機会を求めて

島外へ転出した青年層が、近年の経済不況によりUターンしたためである。

しかし、65才以上の高令者の占める割合は年々上昇し、東京都全域で1番高く(14%、都平均8.0%)、すでに厚生省が発表した昭和70年の日本の予測レベルである12.7%を上まわっている状況である。

4. 産業構造

本地区の昭和55年における総生産所得は、44億8,700万円でその構成をみると、第1次産業8億2,300万円18.3%(農業1億4,900万円18.1%、水産業6億7,400万円81.9%)、第2次産業10億6,200万円23.7%、第3次産業20億0,200万円58.0%であり、昭和45年に比較し、第1次産業93.6%(農業50.5%、水産業116.7%)、第2次産業227.8%、第3次産業130.1%となっている。

一方、産業別就業者構造をみると、第1次産業502人17.4%(農業103人20.5%、水産業399人79.5%)、第2次産業837人2.9%、第3次産業1,549人53.6%となっている。

昭和45年と比較すると、第1次産業従事就業者のウェイトが大きく低下(昭和45年27.8%)し、なかでも農業就業者が1/3に減少している。産業別就業者1人当りの所得をみると、第1次産業1,639千円、第2次産業1,269千円、第3次産業1,680千円となっており、全産業の就業者1人当たりでは1,554千円である(表3)。

次に各産業の現状と問題点についてみると、まず、第1次産業であるが、本地区の農業は農業に適した温暖多雨な気象条件下にあるが、地形上耕地に恵まれないことと、急傾斜地という状況にあることから、農家1戸当りの耕地面積が狭く、経営規模は零細であり、かつ、兼業農家が多い。更に若年労働力の流出、地形上からくる機械導入の困難性という条件下にありながらも、人口1千万人を超える大消費地東京をひかえていることから、近年付加価値が高く換金性の強いそ菜の栽培、花き園芸等の普及の著しい傾向にあり、農業経営にも変化をみている。畜産については、養豚が主で農業構造改善事業の導入により振興を図っているが、流通や輸送コストにあり路があり大きな進展をみていない。林業については、天然の森林が多く古くから薪炭の供給地であったが、燃料消費構造の変化により生産は減少の一途をたどっている。水産業については、当海域が水産資源の豊富な漁場として全国的にも知られたところであり、200海里をむかえた今日、大きな期待が寄せられている海域である。昭和55年の生産額は、15億200万円と第1次産業生産額の中で最高の生産額を示している(表4)。

本地区のおかれている状況からみて、今後も更に振興が可能な産業であり、輸送体系を含めた流通機構の整備が必要であると同時に水産資源も有限であるという観点から栽培漁業の振興を図るなど積極的に取り組む必要がある。

次に第2次産業については、本地域が外海孤立の条件にあるためみるべきものはないが、水産業との関連から水産加工製品が着実に販路を拡張している。また、新島におけるコーガ石が従来は建築石材としてのみ利用されていたものが、タイル状の舗装材としての商品化に成功し、今後各方面での活発な利用が期待される状況にある。

第3次産業については、本地区が富士箱根伊豆国立公園の区域にあり、ここを訪れる人が非常に多く、したがって、観光産業としての将来には大きな期待がもたれている。

B 漁場概要

当地区の漁場は、富士火山帯の海底山脈の山頂部が海上に現れた列島周辺部と、海上に現れない瀬礁（大室出し等）により形成され、海底地形の複雑さと黒潮の流路に当ることから生産性の高い漁場である。沿岸の平均水温は、2～3月が最も低く15℃、7～8月が高く26℃であるが、その年の水温は冷水塊とこれに影響される黒潮流路の位置により変化し、魚群の回遊状況もこれに左右されている。

黒潮流路により海流パターンはA～D型に分類されているが、昭和50年9月に遠州灘沖に定着した大型冷水塊は55年8月まで持続していたが、その後はB～C型となっており、短期間で変化し不安定な海況となっている。

C 漁業の動向

1. 経営体の動向

昭和56年における漁業経営体は262体である。（表5）

経営体階層別にみると、漁船漁業経営体は239体、91%を占めている。昭和52年の163体に比較して、約68%増加している。階層別にみると、0～3トン階層112体、3～5トン階層52体、5～10トン階層46体、10トン以上階層29体で5トン未満階層が69%と大半を占めている。漁船非使用階層は22体8%を占め、主に採貝藻漁業に従事している。また、当地区の漁業協同組合は表6に示すとおりである。

2. 漁船漁業の動向

昭和56年の漁船保有状況は323隻である。3トン未満173隻、3～5トン62隻、5～10トン57隻、10トン以上31隻となっており、約半数が3トン未満である（表7）。これらの漁船は、タカベ建切網漁業、トビウオ流刺網漁業、曳縄漁業、カジキ突棒漁業、底魚一本釣漁業、イセエビ刺網漁業、採貝藻漁業等を組み合わせ周年操業を行なっている。年間稼働日数は150～200日となっている。

3. 漁業生産の動向

本地区の漁業生産量は、昭和56年1,715トンであり、昭和52年1,524トンに比較し

表3 産 業 構 造

	年度	A島内第1次産業			B島内第2次産業			C島内第3		
		農 業	林 業	水産業	鉱 業	建設業	製造業			
就業者数 (人)	45	837	379	5	453	807	114	550	143	1,372
	50	419	92	0	327	863	85	597	181	1,446
	55	502	103	0	399	837	47	596	194	1,549
生産所得 (百万円)	45	425	99	15	311	324	98	161	65	1,131
	50	634	115	8	511	629	149	297	183	2,263
	55	823	149	0	674	1,062	127	701	234	2,602
一所得人当り (千円)	45	508	261	3,000	687	401	860	293	455	824
	50	1,513	1,250	0	1,563	729	1,753	497	1,011	1,565
	55	1,639	1,447	0	1,689	1,269	2,702	1,176	1,206	1,680

表4 第1次産業生産額

単位百万円

年度	農 業	林 業	水 産 業	計
45年	204	21	467	692
50年	311	53	692	1,056
55年	399	8	1,502	1,909

次産業					島外へ 通 勤	総 計	島 民 1人当り	季節出稼 概数推定
小 売 業	金 融 不 動 産 業	運 輸 通 信 等 公 益	サ ー ビ ス	公 務				
420	18	229	458	247	0	3,016		0
435	19	211	534	247	0	2,728		0
433	28	223	636	229	0	2,888		0
242	71	111	537	170	0	1,880		0
376	59	258	1,092	478	0	3,526		0
615	76	300	816	795	0	4,487		0
576	3,944	485	1,172	688	0	623	314	
864	3,105	1,223	2,045	1,935	0	1,293	583	
1,420	2,714	1,345	1,283	3,472	0	1,554	727	

表5 経営体階層別漁業経営体数

区 分		5 2	5 3	5 4	5 5	5 6
総 経 営 体 数		248	371	220	238	262
漁 船 非 使 用		85	129	36	23	22
無 動 力 船 の み		—	7	1	—	—
動 力 漁 船 使 用	計	163	230	183	215	239
	0～1トン	45	74	51	51	49
	1～3	44	54	34	49	63
	3～5	52	65	59	44	52
	5～10	14	22	17	39	46
	10～30	6	14	20	30	27
	30～50	—	—	—	—	—
	50～100	1	1	2	2	2
100トン以上		1	—	—	—	—
小 型 定 置		—	3	—	—	1

表 6 地区内漁業協同組合

村 名	組 合 別	地 区 組 合		
		正 組 合 員 数	准 組 合 員 数	計
利 島 村	利 島 村	53	9	62
新 島 本 村	新 島	123	335	458
	若 郷	97	36	133
	式 根 島	110	152	262
	小 計	330	523	853
神 津 島 村	神 津 島	291	321	612
計		674	853	1,527

表 7 年次別漁船数

階層 年度	無 動 力	0～3トン	3～5トン	5～10トン	10～20トン	計
52年		182	67	6	6	261
53	6	176	77	18	13	284
54	8	168	58	42	20	288
55	5	165	53	53	28	299
56	3	173	62	57	31	323

て12%の伸びで、漸増傾向を示している。

漁業種類別にみると、採貝藻漁業472トン(28%)、底魚一本釣漁業303トン(18%)、タカベ建切網漁業301トン(18%)、トビウオ流刺網漁業208トン(12%)、イカ釣漁業139トン(8%)、カジキ突棒漁業65トン(4%)、その他漁業227(13%)となっている(表8)。

魚種別にみると、トビウオ類258トン、タカベ201トン、たい類195トン、いか類152トン、ぶり類102トン、あじ類86トン、かじき類65トン、えび類29トン、貝類10トン、その他617トンとなっている(表9)。

生産額については、昭和56年1,752,231千円であり、昭和52年1,492,096千円に比較して約17%の伸びを示している。

D 増殖対象生物の漁獲状況並びに採捕形態

表 8 漁業種類別生産量

Kg

年度 漁業別	52年	53年	54年	55年	56年
とび流刺網	125,258	420,123	302,388	76,567	207,831
とび流まき網	25,192	11,579	50,626	17,885	48,621
たかべ刺網	73,136	51,558	44,825	70,921	43,810
たかべまき網			172,857		
建切網	431,163	204,693	60,604	127,208	300,707
棒受網	34,253	53,044	49,076	21,379	2,046
底釣	112,476	318,071	163,704	257,664	303,479
さば一本釣	14,121				
曳縄	94,402	85,780	85,907	10,325	12,807
突棒	145,839	163,863	184,736	60,897	65,094
いか釣	165,814	59,714	112,483	200,651	138,676
えび刺網	19,426	19,912	23,490	25,258	29,174
その他の漁業	157,049	293,175	226,863	361,913	90,838
採貝	29,077	22,125	18,225	8,239	10,295
採藻	9,667	213,592	282,083	191,954	461,356
計	1,523,873	1,917,229	1,777,867	1,430,861	1,714,734

1. イセエビ漁業の現況

当地区におけるイセエビ漁業は、各島の距岸1,000m～2,000m内に設定されている第1種共同漁業権として、行使操業されている。漁期は1月～5月末までと、9月～12月末で、0～5トン未満及び、漁船非使用階層が刺網により操業しているが、イセエビも他の根付資源と同様に資源及び漁場が適切に管理されなければ、減少の一途をたどることが明らかであるため当地域では、禁漁期間、禁漁区域の設定、漁獲制限等を自主的に定めている。また、漁獲された小型のイセエビについては、禁漁区域へ再放流するなど積極的な資源の保護を実施しており、イセエビの操業形態としては、伊豆諸島の中でも理想的な地域であり、漁獲量も多く昭和56年29トンで伊豆諸島におけるイセエビ全水揚量の60%を占めている。

2. イセエビ生産量の経年変化

イセエビの生産量、金額等は表9に示したように、昭和52年から56年までの5年間の平

表9 年次別魚種別生産量

kg
千円

魚 類 別		年 度		5 2 年	5 3 年	5 4 年	5 5 年	5 6 年
		数量	金額					
魚	さ ば	数量	19,693	1,236	221	3,813	8,196	
		金額	1,636	197	51	346	1,094	
	と び う お	数量	150,503	431,996	369,114	96,067	258,388	
		金額	62,679	87,346	130,006	42,425	109,922	
	あ じ 類	数量	172,114	302,133	219,960	192,901	86,348	
		金額	55,507	19,486	60,776	73,464	23,472	
	た か べ	数量	340,009	238,527	190,400	245,667	201,368	
		金額	337,116	245,526	271,173	319,758	232,555	
	い さ き	数量	51,463	33,484	46,753	34,270	20,569	
		金額	60,057	40,201	72,216	51,057	33,402	
	か つ お 類	数量	53,642	21,820	33,474	38,461	4,653	
		金額	29,400	9,744	17,810	18,537	2,845	
	ま ぐ ろ 類	数量	12,619	18,080	25,858	20,633	2,592	
		金額	23,880	22,001	28,606	23,479	3,661	
	か じ き	数量	142,469	166,330	187,416	61,731	64,827	
		金額	232,211	143,362	174,096	95,403	81,997	
	き ん め	数量		172	22	603	2,382	
		金額		120	19	410	2,382	
	た い 類	数量	84,254	203,650	97,049	117,322	195,091	
		金額	94,846	276,842	157,197	197,331	335,027	
ぶ り 類	数量	111,434	131,989	95,431	58,307	101,848		
	金額	156,992	169,865	134,789	90,393	152,447		
し ま あ じ	数量	13,860	15,226	16,022	3,079	2,279		
	金額	17,000	25,485	50,323	20,781	27,957		
さ わ ら	数量	139	92	114				
	金額	72	19	40				
め じ な	数量	6,142	1,679	3,883	13,336			
	金額	4,040	1,101	3,219	12,698			
その他の魚類	数量	46,504	19,368	44,563	99,295	113,052		
	金額	18,010	58,800	23,137	40,809	77,438		
そ水の 他産 の物	い か	数量	173,869	76,023	123,787	219,925	152,379	
		金額	169,567	101,006	145,179	238,060	239,631	
	い せ え び	数量	19,415	19,707	23,490	25,258	29,098	
		金額	118,467	122,261	141,859	169,681	200,456	
	そ の 他	数量	8				13	
		金額	4				13	
貝類	貝 類	数量	58,138	22,125	18,225	8,239	10,295	
		金額	32,980	19,543	18,836	8,253	7,062	
藻類	藻 類	数量	96,667	213,592	282,083	191,954	461,350	
		金額	94,122	111,195	120,601	99,109	157,870	
合 計		数量	1,523,873	1,917,229	1,777,867	1,430,861	1,714,734	
		金額	1,492,096	1,454,100	1,549,933	1,501,994	1,752,231	

均生産量は約23トンであるが、年によって変動がある。これは主として、禁漁区の口開けによるものである。

3. 対象生物の地位

当地区における磯根資源としては、魚類を除くと、イセエビ、テングサ、トサカノリ、トコブシ等がある。この中で、イセエビの占める比重は極めて高く、昭和56年生産量では29トンであり、トサカノリ(296トン)、テングサ(161トン)に次ぐものであるが、生産額では200,456千円と、トサカノリ(108,445千円)、テングサ(45,247千円)を大巾に上まわっている。

今後、磯根資源であるイセエビに対する依存度は増すものと思われる。

4. 採捕の形態

イセエビは、漁業法による第1種共同漁業権の内容として、漁業権行使規則により9月から翌年の5月末までに解禁操業されている。東京都漁業調整規則では6月1日から8月31日までが禁漁期間であるが、漁業協同組合ではさらに、禁漁期間、禁漁区域の設定、漁獲制限等を定めている。漁法は、素潜りによる刺網によって操業されている。

E. 漁場の利用形態

1. 漁業権の種類

当地区における漁業権は、表10に示すとおり各島に第1種共同漁業権が6件(対象、イセエビ、トコブシ、テングサ他)、第2種共同漁業権が6件(対象タカベ建切網、刺網)及び新島に第3種共同漁業権(地曳網)1件が、漁業協同組合に免許されており、イセエビは第1種共同漁業権漁場で水揚げされている。

2. 対象生物にかかる漁業権行使規則の内容

イセエビの採捕に関しては、東京都漁業調整規則によるほか、各島漁業協同組合の漁業権行使規則により行使されており、漁期、体長、漁具漁法については、表11のとおり制限されている。漁期については、このほか理事会で海況により毎年各地先毎に口開け、口止めを取り決め操業期間を決定している。また、特に神津島においては、都の調整規則より厳しい体長制限(15cm)や、制限体長以下のイセエビを採捕した場合の再放流等の資源管理体制を作っている。

F. 地区漁業者の動向

昭和55年の漁業就業者は399人で、50年327人と比較して122%の伸びとなっており、これは近年、若年層のUターン現象や新規卒業者の就業が多くなったためである。

G. 流通加工の現状

表10 地区内漁業権の状況

免許番号	免許の種類	権利者(漁協名)	漁場の位置	漁業の名称
共第3号	第1種	利島漁協	利島村地先距岸1,000 m以内の区域	いせえび, さざえ, あわび, とこぶし, くぼがい, てんぐさ, いわのり, はゞのり,
共第4号	第2種	利島, 新島, 若郷, 式根島漁協	"	たかべ寄網, たかべ刺網, たかべ建切網, いそ魚底刺網
共第5号	第1種	新島, 若郷, 式根島漁協	鵜渡根島地先距岸1,000 m以内の区域	いせえび, とこぶし, さざえ, あわび, くぼがい, てんぐさ, いわのり, はゞのり, とさかのり, ひろめ
共第6号	第2種	"	"	たかべ寄網, たかべ刺網, たかべ建切網, いそ魚底刺網
共第7号	第1種	"	新島, 式根島及び地内島距岸2,000 m以内の区域	いせえび, とこぶし, さざえ, あわび, くぼがい, てんぐさ, ふのり, いわのり, はゞのり, とさかのり, ひじき, ひろめ
共第8号	第2種	"	"	たかべ寄網, たかべ刺網, たかべ建切網, いそ魚底刺網
共第9号	第3種	"	新島本村前浜及び間々下浦先距岸2,000 m以内の区域	地曳網
共第10号	第1種	神津島漁協	神津島及び祇苗島距岸2,000 m以内の区域	いせえび, とこぶし, さざえ, あわび, くぼがい, てんぐさ, いわのり, はゞのり, とさかのり, ふのり, ひろめ
共第11号	第2種	"	"	たかべ刺網, たかべ建切網, いそ魚底刺網
共第12号	第1種	"	恩馳島距岸2,000 m以内の区域	いせえび, とこぶし, さざえ, あわび, くぼがい, てんぐさ, いわのり, はゞのり, とさかのり, ふのり, ひろめ
共第13号	第2種	"	"	たかべ刺網, たかべ建切網, いそ魚底刺網
共第27号	第1種	神津島, 新島, 若郷, 式根島漁協	神津島村銭洲地先銭洲周囲1,500 mの区域	いせえび, とこぶし, てんぐさ, いわのり, はゞのり, とさかのり
共第28号	第2種	神津島漁協(入漁権, 若郷, 式根島漁協)	"	たかべ建切網, たかべ刺網, いそ魚底刺網

(存続期間48. 9. 1~58. 8. 31)

本地区での水産物の流通経路は図のとおりである。生産者が漁協組織を通さずに販売することはほとんどなく、全面的な共販体制を行なっている。

この地区内からの出荷は、トビウオ、タイ類、タカベ、ヒラマサ、カジキ、イセエビ等で、その主な流通経路は、漁獲物を生産者が漁協共販に委託し、これが産地仲買人又は鮮魚運搬を主体

表11 第1種共同漁業権行使状況

項目	組合名	利 島	若 郷	新 島	式 根 島	神 津 島	東 京 都 調 整 規 則
		禁止期間	イセエビ 6.1~8.31	理事会で決定	理事会で決定	理事会で決定	4.0~10.30
	トコブシ	9.1~10.31	"	"	"	11.1~3.31	9.1~10.31
	テングサ	11.1~3.31	"	"	"	9.1~10.31	-
体長制限	イセエビ	-	-	-	-	15 cm以下	13 cm以下
	トコブシ	-	-	-	-	4.5 cm以下	4.5 cm以下
	テングサ	-	-	-	-	-	-
漁具・漁法制限	イセエビ	-	・刺網以外 ・潜水器	・刺網以外 ・潜水器	・刺網以外 ・潜水器	・刺網以外 ・潜水器	漁業権魚種の潜水器使用再捕は漁業権に基づく以外は認められていない
	トコブシ	-	-	-	-	潜水器	
	テングサ	-	-	-	-	・素潜り、潜水器以外	

表12 年次別地域別くさや生産量

(単位：トン)

		53年	54年	55年	56年
利	島 村	-	-	-	-
新 本 村	新 島	(21) 202.4	(21) 195.7	(21) 239.8	(21) 196.0
	若 郷	(5) 55.6	(5) 42.7	(5) 30.2	(5) 36.9
	式 根 島	(3) 14.0	(3) 5.6	(1) 1.1	(1) 3.9
	小 計	(29) 272.0	(29) 244.0	(27) 271.1	(27) 236.8
神 津 島 村	(3) 9.4	(2) 9.9	(2) 7.1	(2) 28.1	
合 計	(32) 281.4	(31) 253.9	(29) 278.2	(29) 264.9	

()内経営体数

とした特定業者によって運搬船で市場に搬入され、流通機構により処理されている。

また、本地区の水産加工品の生産量は「クサヤ」が265トンで、経営体は29体となっている。クサヤ加工の原料は、ムロアジ、クサヤムロなどムロアジ類が圧倒的に多く、この他トビウオ、サメ、タカベ、サンマ等が若干製造されている(表12)。

H. 他の開発計画との関連

当該地区においては、沿岸漁場整備開発事業として、昭和51年から56年度までに、並型魚礁設置事業9ヶ所、事業量3,855空 m^3 、事業費56,265千円で実施し、昭和53年、および昭和55年から58年度に、大型魚礁設置事業を事業量1,2331空 m^3 、事業量178,370千

円をもって実施した。

これら事業の実施箇所は、並型魚礁については、新島式根島地先であり、大型魚礁については、新島、神津島地先である。

また、昭和56年度から4ヶ年計画で、式根島において、対象生物をシマアジとして養殖場造成事業が実施されている。

なお、昭和48年度から57年度にかけて、第2次沿岸漁業構造改善事業の漁場改良事業が、イセエビを対象に、34ヶ所、事業費58,950千円、事業量1,208空 m^3 をもって実施した。

Ⅶ 調査地区選定の理由

1. イセエビ刺網漁業は、当地区の沿岸漁業の中で重要な位置を占めており、その生産量は年平均23トンとなっているが漸減傾向にある。
2. 神津島は、地区内でイセエビの生産量が最も多く、漁場管理体制も確立されている。
3. 漁場造成海域は、漁場造成に必要となる水深10m～30mの起伏の少ないなだらかな傾斜面が約100ヘクタール広がっており、また水深30m附近には海藻（ヒラクサ）が繁茂しているので、各種構造物を設置することにより、ブルススの定着場と稚エビの生育場を造成するのに最適地と言える。

Ⅷ 調 査

A. 環 境 調 査

1. 地形及び地質

a. 調査概要

1) 調査機関

この調査は、東京都労働経済局農林水産部水産課が計画し、株式会社パスコに委託して調査を実施し、水産試験場がとりまとめた。

2) 調査海域

図1に示す神津島北東沿岸海域の水深7～48mについて実施した。調査海域は牛鼻を境として、観音浦地先とハシルマ地先に大別することができる。

3) 調査内容

(1) 基準点測量	横瀬鼻～ハシルマ地先
(2) 海底地形調査	"
(3) 砂層厚調査	観音浦北部～ハシルマ地先

- (4) 底質調査 横瀬鼻～ハシルマ地先
- (5) 砂層厚変動調査 観音浦北部～ハシルマ地先

4) 調査期間

昭和57年7月21日～ 8月 5日

昭和58年9月10日～11月23日

5) 調査方法

(1) 基準点測量

基準点測量は、作根と横瀬鼻に基点を設け、多角測量法により決定した。また、深淺測量及び音波探査における船位決定は、電波測位機を用い、予定測線を円弧状に航走しトランシットによりカットする方法と、トランシットを用い放射直線的に船を誘導して六分儀で基準点を測角する方法を併用した。

(2) 海底地形調査

深淺測量は精密小型音響測深機を使用した。水深の基準面は神津港における潮汐観測資料に基き記録上0.63mを基本基準面とした。測量間隔は観音浦地先で10m、ハシルマ地先で20mとした。作根周辺の浅所ではレッド測深を行なった。

(3) 砂層厚調査

砂層厚調査は放電式音波探査機を使用し、測定間隔は100mとした。

(4) 底質調査

調査海域の16地点で円筒式採泥器を用いて底質の採集を行なった。採泥量は1点につき800cc以上とし、その半量はホルマリン固定後水産試験場で生物を査定し、残り半分はJIS-A1204、A1202により粒度、比重を分析した。

(5) 砂層厚変動調査

砂層厚変動調査は、時期をずらせた2回の測深調査を比較して求めた。

b. 調査結果と考察

1) 位置と地形

神津島は、北緯34°12′，東経139°08′に位置する火山島である。

島の規模は北北東-南南西の長軸方向が約6.6Km，それと直交する最大幅が約5Km，周囲約2.4Km，面積18.5Km²である。

神津島は、伊豆-マリアナ島弧の主脈海嶺から南西方向に派生した「銭洲海嶺」に乗っており、流紋岩を主体とした単成火山群によって構成されている。

この特徴は地形面にも表われている。すなわち形成年代の異なる多数の溶岩流や溶岩円

図1 神津島

頂丘が、島のいたる所に分布し島の地形を複雑にし起伏を大きくしている。

島の最高点は、最も新しい火山活動（西暦838年）によってできた天上山山頂の海拔571.5mで島のほぼ中央部にある。

同島は河川の発達が悪く、わずかに沢や谷がみられる程度である。谷はほとんど侵食谷であるが、南西部の神津沢だけは堆積谷で、火山性砂礫を堆積している。

島の海岸線の大部分は海食崖をなしているが、小さな湾部の狭い範囲には小規模な浜を形成している。また、島の西側に前浜，東側に多幸浜の砂浜海岸がある。島の周囲には、多数の小島，離れ根が散在する。属島に祇苗島と恩馳島がある。

神津島付近の海底地形は、同島の北東-南西方向は「銭州海嶺」の伸長方向と一致し、

200 m以浅の高まりとなっているが、北西-南東方向は急深で、島から約5 Kmで200 m以深となる(図2)。

図2 神津島近海の海底地形

2) 地 質

神津島の基盤とされているのは、北部の海食崖にわずかに露出している。著しく変質(氷長石化作用)を受けたデイサイト溶岩で、第三紀中新世~鮮新世と考えられ、伊豆半島の湯ヶ島層群あるいは白浜層群に相当するといわれている。

現在の島を形成しているのは、第四紀の単成火山群で、それらの活動の時期は大きく三つに区分される。

第1期は、約10万年~5万年前に活動したもので、面房、長浜、観音浦、ハシルマ、砂糠山の5つの各溶岩流が、島の周囲の海食崖下部に見られる。

第2期は、約5万年~1万年前の間に活動があり、主として島の中腹部を形成している。第2期は更に前期、中期、後期に区分される。前期は、島の北北西部に連なる三つの溶岩円頂丘(221 m山、262 m山、那智山)を成す。中期は、島の南部に南南東~北北西に連なる三つの溶岩円頂丘(松山鼻、大沢、高処山)を成す。後期に相当するのは、天上山の北東側中腹に広く分布する丈五郎山溶岩丘である。

第2期に含まれるものとして、天上山の山腹を除く島全体の海食崖上の斜面に広く分布する火砕堆積物があり、秩父山火山砕屑岩と呼ばれているが、先の各溶岩円頂丘との関係は不明確である。

第3期は、約1万年前以降すなわち第四紀完新世から現在にかけて起きた活動である。その始めとして、まず島の北北東~北部に連なる三つの溶岩円頂丘(花立、穴の山、神戸山)がほぼ同じ時期に形成された。次に、島の中心にあり最新の火山である天上山を形成する活動が今から1145年前、西暦838年以降に起こった。活動は、最初に火砕流と火砕サーズの堆積が起り、続いて火砕丘が形成され、最後に溶岩円頂丘の形成とそれに伴うクランブル角礫岩の放出が生じた。これらの噴出、堆積物などによって天上山の山体が形成された。

神津島を形成している単成火山群の溶岩の岩質は、流紋岩が主体であり、第1期、第2期の一部のものを除いて、全て黒雲母流紋岩である。

神津島の地質図および地質層序を、図3、表13に示した。

図3 谷口(1977)¹⁾による神津島の地質図
(地質調査所 1/50,000 図幅より転写)

表 1 3 神津島の層序表

年 代		地 層 名							
第 四 紀	完 新 世	沖 積	海浜および河川堆積物						
		流 紋 岩 単 成 火 山	第 3 期	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4">天 上 山 火 山</td> <td rowspan="4">}</td> <td>クランブル角礫岩</td> </tr> <tr> <td>溶岩円頂丘</td> </tr> <tr> <td>火 碎 丘</td> </tr> <tr> <td>火砕流堆積物</td> </tr> </table> 神戸山溶岩円頂丘 穴の山溶岩円頂丘 花立溶岩円頂丘	天 上 山 火 山	}	クランブル角礫岩	溶岩円頂丘	火 碎 丘
	天 上 山 火 山		}	クランブル角礫岩					
				溶岩円頂丘					
火 碎 丘									
火砕流堆積物									
第 2 期	丈五郎山溶岩円頂丘 高処山溶岩円頂丘 大沢溶岩円頂丘 松山鼻溶岩円頂丘 那智山溶岩円頂丘 262 m 山溶岩円頂丘 221 m 山溶岩円頂丘	秩父山火山碎屑岩							
第 1 期	砂糠山溶岩流 ハンルマ溶岩流 観音浦溶岩流 長浜溶岩流 面房溶岩流								
第 三 紀	中 鮮 新 世	基 盤	氷長石化作用を受けたデイサイト溶岩						

(谷口による表を引用, 原文は英語, ローマ字)

3) 海底地形

観音浦地先の海底地形を図4に示した。観音浦地先を概観してみると、本島から作根に伸びる岩礁列と、牛鼻からせり出した岩礁地帯が存在し、これらの地帯以外は徐々に深さを増す平坦地形を呈している。

岩礁地帯は起伏が激しく非常に複雑で、特に作根の露岩付近は離れ根が点在して複雑である。作根と本島間の鞍部の水深は10～13mである。

南部の平坦地形は、ほぼ岩礁帯に沿う形で湾曲した等深線となり、2.5/100の傾斜で南東方向に深さを増している。中部には、粗礫、転石等が一部存在し、海底傾斜も7/100でやや急傾斜であるが、その沖合は2/100程度の緩傾斜となり、北部になるに従って傾斜を強めながら深さを増している。

ハシルマ地先の海底地形図を図5に示した。ハシルマ地先の海底地形は、大別すると露岩域、緩斜面域、サンドウェーブ域に分けられる。

露岩域は、牛鼻沖の水深7～30mの海域に分布しており、起伏の激しい凹凸地形を呈している。緩斜面域は東～中部および西部にあり、2/100～10/100で北～北西方向に傾斜している。サンドウェーブ域は中部の水深35～43mの海域に分布しており比高2～5mで、北西～南東方向に配列している。

西部の水深15～20mの海域には、1m前後の比高を持つ凹凸地形が分布しており、比較的大きな転石帯を呈している。

4) 砂層厚調査

(1) 音波探査による地層区分

調査海域の地層は、音波探査の結果から音響的特徴をもとに、上層よりa₁、a₂、Bの3層に分類された。それらの地層区分を表14に、音波探査記録を図6に示した。

表14 音波探査による地層区分

時	代	陸上地質	区分	層厚	構成物
第四紀	完新世	海浜および河川堆積物	a ₁	0～8m	砂および砂礫
		火山碎屑岩類	a ₂	0～23m	砂および砂礫
第三紀	更新世	秩父山火山碎屑岩類	B	下限不明	火砕堆積物、溶岩類
	鮮新世～中新世	石英安山岩			石英安山岩

図4 観音浦地先の海底地形図

図5 ハシルマ地先の海底地形図

図6 音波探査記録例

(a₁ 層)

a₁ 層は、音波探査記録では黒味を帯びた平行線パターンを示し、地形勾配の緩い斜面と平坦地形に分布しており、最上位層を構成する地層である。本層の層厚は、沖合側で厚くなる傾向を示すが、分布面積の約2/3は2 m前後である。a₁ 層が厚く分布する場所は a₁ 層の下に埋積谷の発達する箇所と、サンドウェーブ地形が認められる水深40 m以深の海域である。

底質試料によると、本層は粗～細砂で主にガラス質の鉱物から成っており、微細な雲母片、貝殻片を混じる。また場所により、φ = 50 mm程度の垂円礫を主とする礫を含む。音波探査記録から判断すると、本層の推定N値は10以下のルーズな砂層で、潮流波浪等の外力の影響を直接受けている漂砂移動の著しい上部沖積層であると考えられる。

(a₂ 層)

a₂ 層は、音波探査記録によると、白ぬきの平行線パターンもしくは、上部がやや濃い霜降り状のパターンの2種類のパターンが見られる。本層は、a層の大部層であり、分布域もほぼa₁層と同様な範囲に認められる。層厚は、水深が増すにつれ厚くなる傾向を示し、調査域での最大層厚は、牛鼻沖で13 m、ハシルマ沖で23 mとなる。層相は、記録パターンから判断するとほぼa₁層と類似した沖積下部層の砂質土と思われる。a₂層はa₁層に比較して層全体が中位に締まっている感じであり、推定N値が10～15程度と判断される。

(B 層)

B層は、音波探査記録によると、直接海底に露出している箇所と、上部にa₁層とa₂層が堆積する箇所とは、それぞれ記録が異なったパターンを示している。

※ N値とは、重量63.5 Kgの重錘を高さ75 cmの所から自由落下させ、標準貫入試験用サンプル(φ51 mm、L660 mm)を30 cm貫入させるに要する打撃回数をいう。

前者は、表層部での散乱が著しく、散乱現象が内部にまでおよんでおり、記録全体が黒味を帯びた散乱パターンを示している。この事は、B層が層内部まで風化を受け、固結度が低下した事と共に、B層の表面に粗粒堆積物が薄く堆積しているためと思われる。

後者は層全体が白ぬきとなるが、層上面部と層中の所々に強い散乱を示す平行線パターンが見られる。このパターンは、層内での層相変化を伴う固結度の高い地層であると推定される。

本層は、分布域、堆積環境、記録パターンから判断すると、図3、表2に示した新世代第四紀更新世の秩父山火山砕屑岩類（後期）に対比される。

(2) 砂層厚分布

a_1 層および a 層全体 ($a_1 + a_2$) の砂層厚分布を図7、8に示した。

観音浦北部での砂層厚は、 a_1 層が最大4 m、 a_2 層が最大1.3 mで、 a 層全体の厚さは最大1.7 mである。 a_1 および a_2 層は、水深1.5 m以深に分布している。 a_1 層の平均層厚は2～3 mであるが、 a_2 層は5 m以上あり、西部（沿岸部）で薄く南東部で厚い傾向を示す。

ハシルマ地先での砂層厚は、 a_1 層が最大8 m、 a_2 層が最大2.3 mで、 a 層全体の厚さは最大2.5 mでハシルマ地先中部の水深40 m前後のサンドウェーブ地帯および西端部にある。 a_1 層の層厚は2～3 mの海域が広く、3 m以上の層厚分布域は、水深3.5 m以深のサンドウェーブ帯においてのみである。

調査海域における a 層 ($a_1 + a_2$) の分布は、沿岸部より沖合に向かって厚くなる。本海域で a 層の層厚が20 mを越える海域は、ハシルマ地先東部と西部の水深25～40 mの海域である。

5) 底質分布

調査海域の底質採集地点を図9に、粒度分析した結果を表15に示した。

粒度分析した結果と、海底地形および音波探査を基にして、底質分布図を作成し、図10、11に示した。

(観音浦地先)

観音浦地先の砂は、中～粗粒砂より成っており、明灰色～乳灰色を呈する。砂質は石英が非常に多く含まれる他、長石、角閃石等を含む。

全域にわたって砂、礫、貝殻が混入している。礫は垂角～垂円形で、本島と作根間の鞍部の南側 (A8, A9) で採集された。他の地点の礫は、最大径0.9～2.5 mmの中礫であった。

図7 砂層等厚線図(a₁ 層)

図8 砂層等厚線図(a₁ + a₂ 層)

図9 底質採集地点

図10 観音浦地先の底質

観音浦中央部には、東に向かって開いている小規模な浸食谷があり、この地点（A4）の砂質は最大粒径2mmと均質で、中粒砂が主体である。この均質な中粒砂がどこから運ばれて来て堆積したかは明らかでないが、加積曲線の似かよった砂は、牛鼻の岩礁帯の下部（A1, A2）にも存在する。（ハシルマ地先）

ハシルマ地先の砂も、観音浦と同様に石英が主となっている。礫は垂角～垂円形で、石英安山岩のものが多く。特に、B3とB5では5cm前後の垂円礫が採集された。

貝殻は、一般に原形をとどめるものは少なく、二枚貝の破片が多量に混入する場合がある。またコケムシやフジツボの破片も認められる。

牛鼻沖の水深7～30mと、ハシルマ沖の水深10～15mの海域は露岩域となっており、起伏の激しい海底地形を形成している。

ハシルマ沖中央部の水深17～24mの比較的狭い範囲（B6）には、中粒砂が分布しており、A4周辺の底質と同じく転石地帯にやや細かい砂が堆積している。

ハシルマ、牛鼻沖の水深17～37mの海域には、砂礫が帯状に分布する。この海域は、平均傾斜が3/100前後の緩斜面である。

また、ハシルマ沖の水深25m以浅の海域には転石が散在しており、音響測深記録では比高0.2～0.5mの小凸地として不連続に記録され、一部は海底地形図に表わされている。

砂礫帯の沖合には、粗砂が分布している。

表15 底質分析結果一覧表

地点	水深	中央粒径	底質名	比重	備考
A 1	27 m	0.62 mm	c S, s h	2.420	
A 2	25 m	1.00 mm	c S, S, s h	2.396	
A 3	36 m	1.18 mm	c S, G, s h	2.542	径 2.5 cmの礫混入
A 4	15 m	0.45 mm	S, s h	2.404	
A 5	28 m	1.00 mm	c S, S, s h	2.434	
A 6	30 m	1.01 mm	c S, S, s h	2.430	
A 7	35 m	1.11 mm	c S, S, s h	2.475	
A 8	23 m	1.50 mm	c S, G, s h	2.418	径 4 cmの礫混入
A 9	30 m	1.14 mm	c S, G, s h	2.422	径 2.5 cmの礫混入
A10	31 m	1.15 mm	c S, G, s h	2.466	
B 1	31 m	0.90 mm	c S, s h	2.450	
B 2	19 m	0.65 mm	c S, s h	2.498	
B 3	14 m	0.55 mm	c S, G, s h	2.465	8×8×5 cm, 4×3×3 cmの礫混入
B 4	40 m	0.53 mm	c S, s h	2.449	
B 5	31 m	0.60 mm	c S, G, s h	2.416	7×5×4 cm, 6×6×5 cmの礫混入
B 6	19 m	0.33 mm	S	2.441	

(底質の特徴)

砕屑性堆積物を形成する堆積物粒子の運搬形態は、粒子の比重が一定であるとする、その粒径によって決定される。すなわち、細粒子は浮遊懸濁の状態で運搬され、これより大きな粒子は海底面を跳躍して運搬される。さらに大きな粒子は、転動によって運搬される。

これら三種の運搬形態の境界粒径は、運搬媒体の運動エネルギーによって異なるが、通常0.1 mm以下で浮遊運搬され、0.2 mm以下で跳動運搬され、0.2 mm以上で転動によって運搬されるといわれている。

調査海域の底質試料は、すべて転動堆積物より成る事を示しており、波浪や流れの強い影響を受けているといえる。

6) 砂層厚変動結果

期間を隔てた2回の調査による海底地形図を比較し、砂層厚の変動量図を作成した(図

図 1 1 ハシルマ地先の底質

1 2)。2 回目の調査は、台風 8 3 1 7 号が通過した直後の昭和 5 8 年 1 1 月上旬に実施した。

これによると、水深は前回の調査に比較して深くなっており、浸食傾向が認められる。牛鼻沖の水深 2 5 m 以浅は露岩域であり、地形の変化はみられない。水深 2 5 ~ 3 0 m は、0. 1 ~ 0. 3 m の侵食域が帯状に分布する。その沖合域は 0. 3 ~ 0. 5 m 浸食された海域となっており、南東部の一部においては 0. 5 m 以上の減少となっている。

ハシルマ沖は全般に減少傾向を示すものの、極く一部では 0. 1 ~ 0. 3 m の増加域も認め

図 1 2 砂層厚変動量図

られる。水深 30 m 以浅の緩傾斜面では、0.1 ~ 0.5 m の減少がみられ、水深 20 m 前後の転石分布域では、0.5 m 以上の減少がみられる所もある。水深 35 m 以深に分布するサンドウェーブ地帯は、砂層の減少域と増加域が混在している。

調査海域の砂層厚変動は、全般に減少傾向を示したが、直前に台風 17 号が小笠原列島を通過し、10 月にも台風 13 号が三宅島付近を通過しており、台風時の波浪によって、浸食されたと考えられる。牛鼻沖の砂層厚変動調査は昭和 57 年 7 月の海底地形との比較であるにもかかわらず、同様な結果がみられることから、荒天時には浸食され、静穏時には堆積するというサイクルが繰り返されていると推定できる。

2. 気 象

a. 気温・降水量

(方法)

神津島村役場(海拔 36 m)が、毎日実施している気象観測結果から、昭和 47 ~ 56 年の 10 年間の月別平均降水量と、昭和 56 年の月平均気温、月別降水量を求めた。また、神津島に近接する三宅島にある三宅島測候所が発表²⁾した気象年報を表 16 に示した。³⁾

(結果)

表 1 6 三宅島測候所気象年報

昭和56年

要素		月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年
平均海面気圧+1000mb			13.5	13.3	15.6	12.4	9.9	9.9	11.4	6.3	12.5	14.7	17.4	17.7	12.9
気 温 (℃)	平均気温		7.4	8.6	11.7	15.9	18.9	21.6	25.7	26.2	23.0	19.9	15.3	11.7	17.2
	最高	平均	9.5	10.9	14.4	18.8	21.9	24.2	28.1	28.4	25.1	22.2	17.4	14.1	19.6
		極と その起日	15.9 24日	17.2 16日	19.4 26日	23.3 25日	25.2 3日	27.5 28日	30.8 20日	30.5 21日	29.8 4日	26.6 9日	24.1 2日	18.4 19日	30.8 7月20日
	最低	平均	4.5	5.7	8.3	12.6	15.8	18.8	23.5	23.9	20.9	17.3	12.5	8.5	14.4
		極と その起日	-1.1 22日	-0.8 27日	1.9 3日	8.0 22日	11.0 5日	14.0 3日	19.7 5日	21.2 18日	16.9 15日	13.6 24日	6.6 23日	2.5 16日	-1.1 1月22日
	湿 度 (%)	平均湿度		59	62	67	67	73	81	83	80	80	70	67	62
最小		極と	34	27	35	32	34	52	58	47	55	38	36	30	27
		その起日	22日	4日	8日	15日	23日	25日	21日	6日	16日	26日	19日	16日	2月4日
平均雲量			4.9	6.2	6.6	6.6	6.8	7.9	6.0	6.8	7.9	6.1	7.6	4.6	6.5
風 (m/s)	平均風速		5.5	5.1	5.3	4.6	4.8	3.8	3.7	3.9	5.2	4.9	5.5	4.7	4.8
	最大風速 その方向と 起日	最大風速	16.8	17.8	18.2	14.0	18.5	10.2	10.6	17.3	14.6	21.9	16.4	17.4	21.9
		その方向と 起日	WNW 10日	WNW 26日	NNE 31日	WNW 17日	NE 17日	SW 29日	SW 7日	WSW 23日	NNE 9日	NNE 2日	NNE 6日	NNE 30日	NNE 10月2日
日 照	日照時間		1760	145.2	146.0	188.0	212.5	138.9	256.8	201.1	124.8	152.6	99.7	165.5	2007.1
	日照率%		56	48	40	48	49	32	59	48	34	44	32	54	45
降 水	降水総量(mm)		42.0	137.5	288.5	332.0	224.5	166.0	114.0	334.5	411.0	247.5	390.0	57.5	2745.0
	最大日量 その起日(mm)	最大日量	11.5	88.5	48.5	60.5	38.5	58.0	26.5	77.5	133.0	142.5	125.5	16.0	142.5
		その起日	26日	17日	25日	19日	24日	14日	30日	20日	8日	22日	2日	30日	10月22日
	日 数	≥ 0.5 mm	10	9	18	14	12	13	13	15	17	12	19	16	168
		≥ 1.0 mm	8	9	18	13	11	13	12	13	16	11	19	14	157
≥ 10 mm		2	2	11	9	8	5	6	10	8	4	11	1	77	
≥ 30 mm		0	1	3	5	3	2	0	4	5	2	3	0	28	
天	日平均雲量<1.5	2	2	2	2	2	1	0	2	0	4	0	4	21	
	日平均雲量≥8.5	2	6	10	10	9	18	7	11	16	9	14	4	116	
気 日	雪	3	2	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	5	
	積雪	1	1	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	2	
	ひょう	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	霧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雷電	0	0	2	1	0	2	3	2	1	0	1	1	13	
	不照	0	3	5	4	3	4	0	2	6	5	9	2	43	
	風速10m/sec以上	23	15	17	13	9	1	1	6	13	10	18	13	139	

神津島の月平均気温は、昭和56年は図13に示すとおり、1月に8.0℃で最も低く8月が29.8℃で最も高かった。年間平均気温は18.5℃で、日最低气温は1月の-0.2℃、日最高気温は8月の34.2℃であった。

神津島は海に囲まれているため海洋性気候で、冬暖かく夏は涼しいと言える。さらに、黒潮がこの海域を流去し、同緯度の海域より表面水温が高いため、冬は特に高いという特徴がある。

月別平均降水量は、12月から2月の冬期は本州の大太平洋側と同様に乾燥した晴天日が多く、月間降水量は100mm以下である。しかし、黒潮の上空では、空気が暖められ、かつ水蒸気が補給されて成層が不安定となり、対流が起こりやすく、にわか雨が多くなる。また、関東付近の海域は北と南で温度差が大きく、このため伊豆諸島付近は東西走向の気圧の谷や前線がでやすいため、⁴⁾他の季節は雨天・雨量とも多い。梅雨時期は伊豆諸島付近で顕著となるため、本土よりはるかに湿潤で、6月の降水量は200mm以上となる。9～10月は秋雨前線が停滞するうえ、台風が襲来するため降水量は一年中で最も多い。年間の平均降水量は2,110mmである。

昭和56年は「カラ梅雨」の影響で降水量が少なく、8～9月に3つの台風が接近して降水量が増加した(図14)。

図13 月平均気温(昭和56年)

図14 月別降水量

b. 風向・風速

(方法)

三宅島測候所が、昭和53～57年の5年間に観測した毎正時(1日24回)の風向から、⁵⁾日別最多風向を1日の代表風向として選び、月別の風向頻度を求めた。

昭和42～51年の10年間の3時間毎の風向・風速記録から、⁶⁾風向別の10 m/sec以上、15 m/sec以上の回数を求めた。

(結果)

月別風向頻度を図15に示した。5月から8月には、太平洋上の高気圧から吹き出すSWの風が卓越する。9～10月は北高型の気圧配置となり、NE～NNEの風が卓越し南からの大規模な暖湿気の流入を阻止するため、むしろ熱さがなく割にすごしやすい。12～2月の冬期は、WSW～Wの風が卓越し、次いでNNEの風が多い。

冬期は、日本海上のNWの季節風が本州山岳部にぶつかり、一部が琵琶湖方面を迂回して伊豆諸島で西風となり、一部は関東平野から北北東の気流となり、この2つの気流が合流して風が強くなる。従って、風速10 m/sec、15 m/sec以上の回数は12月～2月に、全体の37.7%ずつを占めている。風速10 m/sec以上の日数は、年間の40%を占め、平均して1年に145日に及ぶ。風速20 m/sec以上の強風は、9～10月の台風接近時にNNEの風として出現することが多い(表17, 18)。

調査海域は、高い崖を背にして東に面しているため、冬期の西風に対して陰に当たるが、NNEの強風は海域に吹きつけることになる。

図15 三宅島の月別風向頻度(毎正時)

表17 風向別, 風速10 m / sec以上の回数 (3時間毎, N=3653)

月	風向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	計	比率(%)
1		1	40	4		1				1		1	30	63	50			192	13.2
2		2	55	10			1	2				4	19	36	43			172	11.8
3		1	44	17		4			1			5	25	29	39			165	11.3
4		1	41	25	1	12	3		1	4		9	11	6	5			120	8.3
5		2	23	17		4	3	2	1	1	3	5	18	3	1			83	5.7
6			24	8		8	1	3	2	2	4	5	5					62	4.3
7			10	8		2	3	2		1	3	14			1			44	3.0
8			14	10	1	1				2		3	2					33	2.3
9		2	52	19		3	1					3	6					86	5.9
10		1	104	13	1	6		1			1		13	8	5			153	10.5
11		1	82	8					1			3	21	31	13			160	11.0
12		1	29	7		1			3		1	2	22	73	44		1	184	12.7
計		12	518	146	3	42	12	10	9	11	13	54	172	249	200	1	2	1454	100
%		0.8	35.6	10.0	0.2	2.9	0.8	0.7	0.6	0.8	0.9	3.7	11.8	17.1	13.8	0.1	0.1	99.1	

(1967~76年累積)

表18 風向別の風速15 m / sec以上の回数 (3時間毎, N = 3653)

風向 月	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SEE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	計	比率(%)
1		15(2)	2		1(1)							3	13	17		(1)	51(4)	14.6
2		22(4)	3(1)									4	7	10			46(5)	13.1
3	1	7(1)	4		2							1	11(1)	12			38(2)	10.9
4		12(5)	6										2				20(5)	5.7
5	2	5(1)	1									1	1				10(1)	2.9
6		9(2)	2(1)														11(3)	3.1
7		4	4														8	2.3
8		3(1)	1														4(1)	1.1
9		25(5)	3														29(5)	8.3
10		44(6)	5		1												50(6)	14.3
11	1	33(1)	1									1	11	1			48(1)	13.7
12		11(1)	1		1							1	14(1)	7			35(2)	10.0
計	5	190(2)	33(2)		5(1)							11	59(2)	47		(1)	350(3)	100
%	1.4	54.3	9.4		1.4							3.1	16.9	13.4			99.9	

(1967~76年累積)

()内の数字は20 m / sec以上の回数

3. 海 象

a. 水温・塩分

(方 法)

神津島漁業協同組合が毎日実施している前浜での宅地水温観測の資料から、昭和41～57年の17年間の旬別偏差を求めた。また、都水試大島分場の調査指導船「みやこ」(127.32⁷⁾トン)による毎月1回の沿岸定線観測結果から、T-S図を求めた。

(結果と考察)

神津島の旬別平均水温を、図16に示した。水温は2月中旬に15.2℃の最低値を示し、8月下旬に26.1℃の最高値を示した。17年間の日最低水温は、伊豆諸島が大型冷水塊に広く覆われた昭和45年2月の11.1℃、日最高水温は、黒潮の北縁(フロント)が大島～新島間にあり神津島が最高水温帯に位置した昭和41年8月の29.8℃であった。

過去の旬別水温と旬別平均水温との偏差を図17に示した。伊豆諸島海域の水温は、黒潮の変動、すなわち黒潮流軸が伊豆海嶺のどこを通過するかによって大きく左右され、神津島の定地水温の変動は、周年にわたって大きい。

沿岸定線観測資料から、水温平年値を求め伊豆諸島海域の海況を概括すると、三宅島付近で東西に描いた線により、南北に沖合黒潮域と沿岸混合域に分けることができ、水温の変動量は沿岸寄り小さく、沖合側で大きい傾向がある。神津島は、両海域の境界部に位置するといえる。

また、図17から旬毎の変動や短期的な変動のほか、A型海況による高水温期(昭和50～54年、56～58年)と、大型冷水塊が長く滞留する冷水温期(昭和43、45、46年)の長期的変動が存在することが認められる。

神津島の北西約5マイルに位置する。沿岸定線観測点St. T10(図18)のデータから、表面水の月別平均水温、平均塩分量を求め、T-S図を作成した(図19)。沖合のデータだが、平均水温は神津島定地水温と良く対応している。

塩分量は、34.04～34.77‰の範囲にあり、1月から4月は高塩分量で安定しているが、7～8月は黒潮表層水が南方の降雨の影響で塩分量が低下するのを反映してか、34.0～34.2‰台の塩分量となった。

図-16 神津島旬平均定地水温(昭和41~57年)
 範囲は最高・最低の変動巾を示す。

図-17 神津島定地水温の旬別偏差

図-18 沿岸観測定線図

図-19 沿岸定線 St. T10 の月平均水温
・塩分による T-S 図 (昭和 39~57 年)

b 波 浪

(方 法)

運輸省第 2 港湾建設局が、大島波浮港沖水深 50 m に設置している超音波高計の記録から、昭和 4 9~5 5 年の異常波浪と、5 6 年の台風接近時の波浪を求めた。また、昭和 5 2~5 6 年の月別、季節別の有義波の出現率を求めた。

東京都港湾局が、神津島前浜沖水深 2 0 m に設置した波高計の記録から、昭和 5 8 年の荒天時の波浪を求めた。

(結 果)

昭和 4 9~5 5 年の異常波浪のうち、上位 1 0 位を表 1 9 に示した。

昭和 5 6 年に神津島近傍を通過した台風は、1 5, 2 2, 2 4 号である。1 5 号は、8 月 2 2 日に伊豆諸島を北上し、2 3 日 0 4 時に館山に上陸した。2 3 日 0 2 時は最大有義波の $H_{1/3} = 8.41 \text{ m}$, $T_{1/3} = 1.1 \text{ 秒}$ を記録し、2 3 日 0 6 時に $H_{\text{max}} = 13.99 \text{ m}$, $T_{\text{max}} = 1.35 \text{ 秒}$ であった。2 2 号は、1 0 月 1 日夜半に八丈島南方を通過した。

1 0 月 1 日 2 4 時の最大有義波は、 $H_{1/3} = 4.34 \text{ m}$, $T_{1/3} = 1.09 \text{ 秒}$, $H_{\text{max}} = 12.07 \text{ m}$, $T_{\text{max}} = 1.26 \text{ 秒}$ を記録した。2 4 号は、1 0 月 2 2 日夜半に御蔵島付近を通過して房総半島に上陸した。2 3 日 0 4 時の最大有義波は、 $H_{1/3} = 9.87 \text{ m}$, $T_{1/3} =$

10.2秒, $H_{max}=14.32m$, $T_{max}=13.4$ 秒で、いずれも記録的な異常波浪であった。

昭和52～56年の波浮港月別、季節別の有義波の出現率を表20に示した。日平均有義波ではなく、2時間毎の観測時の有義波の出現率を求めたため、波高、周期とも値は大きくなっている。

波高5m以上の高い波は、冬期以外の春、夏、秋に出現している。これは、伊豆諸島が前線が形成されやすい位置にあり、この前線に伴う低気圧や台風が高い波を起こすためである。冬期の強い季節風は、大島では予想外に高い波を発生させない。

8月に、波高8m以上、周期12秒以上の異常波浪が出現しているが、これは前記のとおり、昭和56年8月の台風8115号によるものである。10～11月の14秒以上の長期の波も、台風の北上に伴うウネリと考えられる。

東京都港湾局が設置した、神津島前浜沖波高計の記録によると、昭和58年3月3日の前線性低気圧時には、 $H_{1/3}=3.52$ 計、 $T_{1/3}=6.9$ 秒(12時)、 $H_{max}=6.34m$, $T_{max}=7.0$ 秒(14時)であった。8月17日の台風13号接近時には、 $H_{1/3}=4.43m$, $T_{1/3}=12.4$ 秒、 $H_{max}=7.30m$, $T_{max}=17.6$ 秒(10時)であった。11月18日の瞬間風速30m/秒の西風が吹いた日には、 $H_{1/3}=5.5m$, $T_{1/3}=8.4$ 秒(6時) $H_{max}=8.01m$, $T_{max}=8.3$ 秒(18時)であり、西風によって高い波が発生する場合のある事を示した。

c 流況

1) 神津島周辺の流況

(方法)

神津島周辺の流況を知るために、神津島の北西約5マイルに位置する沿岸定線観測点 St.T10 の、昭和49～57年の9年分の流向・流速観測結果を使用した。また、昭和56年12月16～17日に、大島分場調査指導船「やしお」と地元船によって、神津島周辺の6測点で、ロランCによる漂流法(5～15分/回)で流れの観測を行なった。

(結果と考察)

St.T10の流向、流速と、各月の黒潮流路パターン(二谷¹³⁾による)を表21に示した。

St.T10の流向頻度をみると(図20)、東流と南東流が卓越し、北東流を加えた東向きの流れは全体の72.1%を占め、神津島周辺の流況が黒潮の影響下にあることを示している。逆に、西向きの流れは少なく、北西流は観測されなかった。

友定(1977¹⁴⁾)は、伊豆諸島海嶺周辺でSTDを用いた微細観測を行ない、200m以浅の海域では海底地形による擾乱は列島線の東西を問わず大きく、伊豆諸島海域では他の海域に比べて、黒潮表層水が大きく沿岸寄りに張り出すと報告している。

(波 浮)

表19 異常波浪一覽表

	出現年月日時	H 1/3 (m)	T 1/3 (S)	H max (m)	T max (S)	継続時間			H max H 1/3	発生要因
						3m以上	5m以上	7m以上		
1	1979年 5月14日20時	7.13	1071	10.92	12.5	30	10	2	1.56	前線性低気圧
2	1974年 8月26日12時	6.85	1107	10.08	9.5	8	4		1.47	台風第7414号
3	1979年10月19日18時	6.74	1190	9.84	14.5	10	4		1.46	台風第7920号
4	1975年11月12日18時	6.20	1506	10.92	15.5	46	2		1.76	前線性低気圧
5	1978年 3月10日16時	6.14	926	10.08	8.5	16	8		1.64	二ツ玉低気圧
6	1977年 3月24日 6時	6.00	989	9.72	8.0	30	6		1.62	太平洋岸前線低気圧
7	1975年 9月 7日12時	5.68	1340	7.92	14.9	22	2		1.39	台風第8号
8	1979年 4月 8日20時	5.64	823	8.40	8.0	16	2		1.49	前線性低気圧
9	1974年 8月30日24時	5.42	1266	8.76	12.0	28	2		1.62	台風第16号
10	1980年10月 4日 8時	5.10	1300	6.70	11.9	60	2		1.31	台風第18号

表 2 0 昭和 5 2 ~ 5 6 年波浮港

(波

波高 期間		0 m	1.0 0 ~	1.5 0 ~	2.0 0 ~	2.5 0 ~	3.0 0 ~	3.5 0 ~	4.0 0 ~	4.5 0 ~
		0.9 9	1.4 9	1.9 9	2.4 9	2.9 9	3.4 9	3.9 9	4.9 9	4.9 9
月 別	1	17.2	38.6	27.4	11.7	3.8	0.8	0.3	0.2	0.1
	2	11.7	40.8	30.0	11.8	4.5	0.8	0.3		0.1
	3	11.3	36.1	30.1	11.6	5.1	2.2	1.8	0.8	0.4
	4	11.1	39.6	27.9	10.4	5.9	2.2	1.5	0.7	0.5
	5	27.3	36.1	19.8	9.8	3.7	1.9	0.7	0.2	
	6	30.2	46.0	18.0	3.9	1.6	0.3		0.1	
	7	41.6	40.9	11.9	2.9	1.4	0.6	0.4	0.3	0.1
	8	25.0	45.0	16.3	7.3	3.1	1.2	1.0	0.3	0.3
	9	25.6	39.5	19.0	8.8	4.6	1.6	0.5	0.2	0.1
	10	12.6	32.5	24.2	16.8	6.6	4.0	1.4	0.8	0.4
	11	15.0	33.3	26.5	15.9	6.2	2.2	0.5	0.2	0.2
	12	19.1	42.7	22.4	10.0	4.1	1.6	0.1	0.1	
季 節 別	春	166.3	372.8	259.2	106.0	49.1	2.1 1	1.3 5	0.5 7	0.3 0
		166.3	539.1	798.3	904.3	953.4	974.5	988.1	993.8	996.8
	夏	320.5	439.6	153.8	4.80	2.0 6	0.7 0	0.5 0	0.2 0	0.1 4
		320.5	760.1	91.39	96.19	98.26	98.96	994.6	996.6	998.0
	秋	176.7	350.8	232.8	138.6	5.8 5	2.6 2	0.8 1	0.3 8	0.2 4
		176.7	527.5	760.3	898.9	957.4	983.5	991.7	995.4	997.8
	冬	163.5	407.0	263.3	110.9	4.1 0	1.0 9	0.2 2	0.0 8	0.0 4
		163.5	570.6	893.3	944.8	985.7	996.6	998.8	999.6	100.0
年 間	20.4 4	39.1 7	22.8 6	10.2 4	4.2 8	1.6 4	0.7 0	0.3 0	0.1 7	
	20.4 4	59.6 1	82.4 7	92.7 2	96.9 9	98.6 4	99.3 4	99.6 4	99.8 2	

注：季節別および年間の欄の下段は未超過確率

月別、季節別の有義波の出現率

高)

(単位：%)

5.00～ 5.49	5.50～ 5.99	6.00～ 6.49	6.50～ 6.99	7.00～ 7.99	8.00～ 8.99	観測年月	観測率
						52～56年	97.4
						"	83.7
0.3	0.1	0.2				"	78.2
	0.1					52～54年, 56年	79.9
0.1	0.1		0.1	0.1		"	78.9
						"	77.0
						"	77.1
0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	"	85.8
						52～56年	92.3
0.4	0.1		0.1	0.1		"	89.8
						"	95.1
						"	98.1
0.14 99.81	0.07 99.88	0.07 99.95	0.02 99.98	0.02 100.0		3. 4. 5月	79.0
0.02 99.82	0.07 99.89	0.02 99.91	0.02 99.93	0.05 99.98	0.02 100.0	6. 7. 8月	80.0
0.12 99.90	0.04 99.94		0.04 99.98	0.02 100.0		9. 10. 11月	92.4
						12. 1. 2月	93.3
0.07 99.89	0.04 99.93	0.02 99.95	0.02 99.97	0.02 99.99	0.01 100.0	52～56年	86.1

(周)

期間	周期	0 sec ~	4.0 ~	6.0 ~	8.0 ~	10.0 ~	
		3.9	5.9	7.9	9.9	11.9	
月別	1	0	24.8	65.1	94	0.7	
	2	0	15.8	65.1	17.6	1.3	
	3	0	12.9	63.0	21.2	2.3	
	4	0	11.8	66.1	20.8	0.8	
	5	0	12.6	70.0	16.1	1.2	
	6	0	12.6	72.7	13.3	0.6	
	7	0	9.3	52.1	36.7	1.8	
	8	0	6.8	48.9	36.6	7.4	
	9	0	6.0	60.8	27.1	5.5	
	10	0	9.0	44.1	35.0	9.6	
	11	0	11.9	55.4	25.1	6.5	
	12	0	17.3	55.0	25.4	2.2	
季節別	春	0	12.41	66.39	19.39	1.45	
		0	12.41	78.80	98.19	99.63	
	夏	0	9.47	57.42	29.29	3.47	
		0	9.47	66.89	96.17	99.64	
	秋	0	9.00	53.46	29.05	7.24	
		0	9.00	62.46	91.51	98.75	
	冬	0	19.56	61.45	17.50	1.41	
		0	19.56	81.01	98.51	99.92	
年間	0	12.73	59.51	23.78	3.46		
	0	12.73	72.24	96.02	99.48		

地：季節別および年間の欄の下段は未超過確率

期)

単位：%

1 2.0 ~ 1 3.9	1 4.0 ~ 1 5.9	1 6.0 ~ 1 7.9	観 測 年 月	観 測 率
			5 2 ~ 5 6 年	97.4
0.1			"	83.7
0.6			"	78.2
0.5			5 2 ~ 5 4 年 5 6 年	79.9
			"	78.9
0.7			"	77.0
0.1			"	77.1
0.3			"	85.8
0.5			5 2 ~ 5 6 年	92.3
1.7	0.4	0.1	"	89.8
0.9	0.1		"	95.1
0.2			"	98.1
0.37 100.0			3. 4. 5 月	79.0
0.36 100.0			6. 7. 8. 月	80.0
1.05 99.80	0.16 99.96	0.04 100.0	9. 1 0. 1 1 月	92.4
0.08 100.0			1 2. 1. 2 月	93.3
0.47 99.95	0.04 99.99	0.01 100.0	5 2 ~ 5 6 年	86.1

St. T10 は、銭洲海嶺の西側の縁にあり、(水深500m)、神津島も銭洲上に突き出した島であるため、海底地形による擾乱を受け複雑な流れの様相を示すのは明らかであるが、基本的には東に向かう流れが支配的であると考えられる。従って、調査漁場である神津島北東沿岸域は、流れの後流域となることが多いと推定される。

St. T10 の月別平均流速を図21に示した。黒潮の流速は、一般に初夏から夏にかけて強勢となり、秋に弱まり、冬に一時強くなり、初春に一時衰えるパターンを示す。St. T10 も同様の傾向を示している。9年間の平均流速は0.90kt、最大流速は昭和52年8月の3.2ktである。

調査指導船「やしお」と地元船による流れの観測を行なった時期には、黒潮は遠洲灘沖の冷水塊を迂回したのち伊豆諸島の西側を北上して房総半島に接岸していた。このため、黒潮系水は大島付近まで波及しており、神津島では北東流となっていた。

観測結果を図23に示した。南側のSt. 1と2は、孫平根から東に延びる潮目の沿岸よりであり、流れは弱かった。St. 3と6は北東に向かう海流の影響を受け、それぞれ1.48と0.88ktのやや強い流れであった。

調査海域では、観音浦地先は北北東の流れで0.69ktであり、北東流の影響を受け易いように見える。ハシルマ地先は流れの島陰側に当たり、赤崎から北東に向かう潮目の沿岸よりであり、0.38ノットの南東に向かう反流が見られた。

図-20 沿岸定線St. T10の流向頻度 (昭和49~57年)

図-21 沿岸定線St. T10の月平均流速範囲は最大・最小流速への変動巾を示す (昭和49~57年)

図-23 表層流(昭和56年12月16~17日)

図-23 流速計設置位置

表21 沿岸定線 St. T

年 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
昭和 49年	O N 0.6	O N 0.6	O N 0.6	260° N 0.5kt	O N 0.6	110° B 0.6	
50年	欠測 N ↓ B	欠測 C	270° C ↓ N 1.0	85° 1.0	60° N 1.3	160° N 2.0	
51年	60° A 1.2	0° A 0.2	55° A 1.2	欠測 A	90° A 0.4	70° A 0.6	
52年	15° A 1.0	70° A 0.8	90° A 1.0	75° A 1.5	40° A 0.4	90° A 0.4	
53年	100° A 0.6	60° A 0.9	90° A 1.0	25° A 0.2	131° A 0.5	74° A 0.55	
54年	82° A 1.10	130° A 0.47	136° A 1.10	110° A 0.30	128° A 1.82	135° A 2.55	
55年	192° A 0.37	246° A 0.23	135° A 0.35	156° A ↓ B 0.88	344° B 0.77	134° C 0.89	
56年	62° B ↓ C 0.35	256° C ↓ D 0.41	210° N 1.43	143° N 0.65	120° N 0.4	115° B ↓ C 1.81	
57年	151° B 0.78	155° B 0.94	86° B 0.75	143° B 1.50	60° B 1.2	12° C 0.4	

注 小数点第1位の直は漂流法, 第2位の値はGEKによる。

10 の流向・流速

(流路パターンは二谷による)

7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
70° C 1.6	250° N 2.0	90° N 1.0	270° A 1.0	O N	欠測 N
80° N 1.8	70° A 1.8	130° A 0.2	欠測 A	欠測 A	35° A 1.5
70° A 1.5	90° A 2.0	95° A 1.0	115° A 1.2	欠測 A	欠測 A
270° A 0.4	52° A 3.2	50° A 1.0	0° A 0.7	90° A 0.5	115° A 0.6
120° A 1.50	52° A 1.40	119° A 1.03	262° A 0.36	120° A 1.53	115° A 1.05
70° A 2.40	351° A 0.95	168° A 0.97	175° A 1.22	欠測 A	165° A 0.38
59° C 1.71	208° C ↓ D 1.46	205° N 1.12	132° N 0.32	141° N 0.97	117° B 0.60
97° D ↓ N 1.13	85° N 0.3	347° B 0.8	221° C ↓ D・B 0.4	124° D・B 0.6	O B
0° B 0.2	37° B ↓ C 0.2	213° C ↓ B 0.5	75° B ↓ C 0.85	108° C 0.71	113° B 0.80

2) 調査海域の流況

(方法)

昭和58年1月17~25日の9日間、観音浦地先の水深20mの地点に磁気記録式流向流速計を水面下5mに設置した。やや沖合の水深28mの地点に長期捲自記流向流速計を水面下10mに設置した。

昭和58年10月17~28日の12日間、観音浦地先の水深23mの地点の水面下3mと18mの2層に流向流速計を設置して測流を行なった(図23)。

昭和58年8月3日に水面下5mに吊るした海流板(45×90cmの板を十文字に組み合わせたもの)を追跡し、20分毎にロランCで位置を決定した。

(結果と考察)

流向流速計を設置した、昭和58年1月と10月の黒潮は、遠洲灘沖の冷水塊を迂回したのち八丈島付近を北西に流去し、伊豆諸島中部海域で進路を東~北東に変えていた。従って、神津島周辺は黒潮(分枝)流内に位置し強い北東流が流去していたと考えられる(図24)。

1月17~25日の記録から、水深別に流向頻度、流速頻度を求め、図25・26に示した。

図-24 流況調査時の黒潮流軸模式図¹⁵⁾

図-25 流向頻度図(昭和58年1月17~25日)

図-26 流速頻度(昭和58年1月17~25日)

流向は、沿岸海域の特徴である等深線に平行な南北流が主となっているが、北流が著しく卓越しており、 $340^{\circ} \sim 20^{\circ}$ の範囲に含まれる北向きの流れの割合は、水深 20 m の地点で 68.5% 、水深 28 m の地点で 62.3% を占める。これに対して、 $160^{\circ} \sim 200^{\circ}$ の南流が占める割合はそれぞれ 7.3% 、 8.1% にすぎない。最多流向は水深 20 m で 0° 23.3% 、水深 28 m で 10° 、 26.7% である。

流速頻度をみると、 24 cm/sec 以下の流れが水深 20 m で 75.2% 、水深 28 m で 66.8% を占める。 50 cm/sec (1 kt)以上の速い流れは、それぞれ 4.7% 、 7.4% で、沖側の方が海流の影響を受けやすく流れが速かった。

沖側の水深 28 m の地点で、流向別の最大流速をみると、南北方向で速く最大値は 83 cm/sec (0°)、第2位は 78 cm/sec (10°)と北向きの流れが強く、南向きの流れの最大値は 32 cm/sec (190°)で全体の第9位に当たる。

10月17～28日の記録から、表層(3 m)・底層(18 m)別に流向頻度、流速頻度を求め図27、28に示した。水深 18 m のデータは、マイクロスイッチの故障のため、10月24日10時30分までの273データである。

図27 流向頻度図(昭和58年10月17～28日)

図 28 流速頻度 (昭和 58 年 10 月 17 ~ 28 日)

流向は、表層底層とも 1 月同様北流が卓流している。しかし、 $340^{\circ} \sim 200^{\circ}$ までの流向頻度は、表層で 7.47% で 1 月の水深 20 m 地点での出現率を上回ったが、底層では 4.14% を占めるにすぎない。底層では、北流に次いで南流 ($160^{\circ} \sim 200^{\circ}$) が 15.4% を占め、北東流も多く出現する。

神津島周辺の潮流は一般に、低潮時の約 1 時間後から次の高潮時の約 1 時間後までは西流となり、逆に高潮時の約 1 時間後から次の低潮時までは東流が流れる。調査海域の流向を満干潮と対比すると、正確には一致しないが、落潮時に南流が流れ、張潮時に北流が流れるようである。

流速頻度は、表層は 1 月の 20 m 地点同様の分布を示し、最大流速は 10 月 24 日 05:55 分の 96 cm/sec (1.87 kt) と 1 月を上まわった。底層では $20 \sim 24 \text{ cm/sec}$ にモードがあり、最大流速は 61.4 cm/sec (1.19 kt) で、表層のほぼ $2/3$ の値であった。流向別の最大流速をみると、 0.5 kt 以上の流速が観察された方位 (10° 毎) は、表層の 9 方位に対して底層は 23 方位あり、表層と底層では流れの様相がやや異なると考えられる。

10 月 17 ~ 18 日 (月齢 11 ~ 12 日) のデータを調和分析して、図 29 に潮流楕円を示した。恒流成分は、表層で 18.4 cm/sec (3°)、底層で 15.9 cm/sec (17°) と北向きで大きかった。表層では日周潮流が卓越し、半日周潮流の振幅は日周潮流の $2/3$ 程度である。長軸の方向は N ~ NNE 及び S ~ SSW である。

底層では、日周潮流の振幅が小さくなり半日周潮流とほぼ同じである。長軸方向は、日周潮流は NNE 及び SSW であるが、半日周潮流は NNW 及び SSE であり、多少位相が

異なっている。

黒潮の流れが南西から神津島周辺に流れ込む時期の調査海域は北流が支配的となる。恒流成分と張潮時の潮流との方向が一致するため、表層の最大流速は2 kt 近くの速さを示す。しかし調査海域南端部の作根と本島間の岩礁が鞍部となり、底層では北流のほか北東や南東方向に発散する流れがあると推定できる。また、表層では南流が発生しにくい傾向がうかがえるが、原因は明らかでできなかった。

海流板追跡調査を実施した8月上旬には、黒潮は伊豆諸島の東側を北上しており、神津島は黒潮系水と沿岸系水との混合水域に位置して強い流れは見られなかった。

当日の月齢は24日小潮で、風はSW 2であった。牛鼻沖のa～cは張潮時、d～fは落潮時に当たる(図30)。

牛鼻沖のaは約1時間滞留し、沖合のcは0.3～0.5 kt の速さで東へ移動した。11時頃(a₄, b₄, c₄)、沖合にあったNWからSEに延びる潮目が南下してきて牛鼻に達したため、海流板は反転してハシマル地先を西～西北西に移動した。最大流速はc₆→c₇の西北西流で4.18 cm/sec (0.81 kt)であり、東流ではc₁→c₂の2.44 cm/sec (0.47 kt)であった。

観音浦沖では、d, e, fとも南東へ平行して移動し、fは作根に打ち上げられた。岡の作根をかわしたe₃は、作根に向かいその南端に打ち上げられた。dも岡の作根と並んだ後、急に東側に向きを変えた。最大流速はe₂→e₃の2.42 cm/sec (0.47 kt)、平均流速は0.31～0.36 ktであった。

神津島の北東側では、砂糠崎、祇苗島の南端(カド)とともに牛鼻に地形性の潮目が形成され易い。調査海域の流況は、牛鼻を境に多少変化するが、基本的には海岸と平行した流れである。調査時には、祇苗島の南端から北に向かって潮目があり、d, e, fともこ

図29 潮流情円(S58.10)

の潮目に集束したと考えられるが、作根付近で向きを変えており、流況に及ぼす地形の影響の大きさを示唆している。

図30 海流板流跡

4. 環境調査結果要約

1. 神津島の海岸線は、ほぼ全島にわたって50～200mの高さの、流紋岩質の海食崖にかこまれている。調査海域は、島の北東側に当たり、牛鼻を境に観音浦地先とハシルマ地先に分かれる。海岸線は、転石海岸と岩礁が交互につながっている。
2. 海底地形は、水深25m以浅は概ね岩礁域で起伏が激しい。25m以深は砂地で2/100～10/100のゆるやかな勾配である。15～20mの海域は所々転石帯となっている。作根と本島間では岩礁が鞍部を形成している。ハシルマ沖水深25～40mには比高2～5mのサンドウエーブ地形がみられる。
3. 地層は上からa₁、a₂、Bの3層に分けられる。a₁層は粗～細から成り、層厚2～3mで移動しやすい。a₂層は、深さを増すにつれ厚くなり、a₁層に比べて中位に締っている。B層は固結度の高い層である。

4. 底質は、沿岸部は岩が分布しており、沖合は中～粗砂が主体の砂が分布する。2.5 m以浅の砂底には大型転石が多数散在し、一部に礫が混入する。
5. 中～粗砂は転動堆積物の特徴を示す。
6. 砂層厚は0.1～0.5 mの減少傾向がみられたが、荒天時に侵食され、静穏時に堆積されるというサイクルを繰り返しているとは推定した。
7. 神津島の月平均気温は、8.0～29.8℃の範囲であった。降水量は冬期に少なく、梅雨期と台風時期に月間200 mmを越える。年間平均降水量は2,110 mmと多い。
8. 風向は、5～8月はSW、9～10月はNE～NNE、冬期はWSW～Wの風が卓越する。風速10 m/sec以上の風は年間の40%以上を占め、10～3月にNNEとWの風として出現することが多い。
9. 神津島の旬別平均定地水温は、15.2～26.1℃の範囲にあり、水温の変動が激しい。黒潮の流路変動により、高水温期と冷水温期がある。日最低水温は11.1℃、日最高水温は29.8℃である。
10. 神津島周辺のT-S図を作成すると、典型的な黒潮系表層水の性質を持つことが判明した。
11. 神津島周辺の流況は、黒潮の影響を直接的に受け、東流と南東流が卓越し、東北流を加えた東向きの流れは全体の72.1%を占める。最大流速は3.2 kt (52°)であった。
12. 調査海域の流況は、海岸線に平行した南北方向の流れが基本となり、張潮時に南流、落潮時に北流が発生する。神津島が黒潮流路に位置する時期には、北向きの恒流成分が強いため表層では北流が62.3～74.7%を占め卓越する。最大流速は83～96 cm/secと速く沖側でより速い。しかし、底層では作根と本島間の鞍部の影響で、北流は4.4%となり北東流、南東流が増加する。
13. 神津島が黒潮流路から外れた時期の調査では、海流板は潮目に集束されるか、海岸と平行して流された。ハンマル沖の最大流速は、42 cm/sec、観音浦の南向きの流れの最大流速は24 cm/secとゆるやかであった。

5. 環境調査引用文献

- 1) 谷口宏充：神津島の火山地質、火山、第2集 vol. 22, 133-147 (1977)
- 2) 東京都神津島村役場：神津島村勢要覧資料(1972～81)
- 3) 東京管区气象台：東京都気象年報(1981)
- 4) 加藤久雄：伊豆諸島の気象、気象'82-5, №301, 日本気象協会(1982)
- 5) 東京管区气象台：東京都気象月報(1982～82)
- 6) " : 風に関する気象資料(1980)

- 7) 東京都水試：定地観測表（1966～82）
- 8) "：漁海況予報事業水温速報（1964～82）
- 9) 武藤光盛：伊豆海嶺海域の海況について，水産海洋研究会報，№34別刷，137-140（1979）
- 10) 運輸省港湾技術研究所：10ヶ年統計資料（1981）
- 11) "：波浪拠点観測年報（1977～81）
- 12) 東京都港湾局離島港湾部：未発表
- 13) 二谷頼男：最近数年の黒潮の変動について，水産海洋研究会報№14（1969）
- 14) 友定 彰：伊豆諸島海域の黒潮調査，東海区水研報，№89（1977）
- 15) 海上保安庁水路部：海洋速報№2，3，20，21（1983）
- 16) 海上保安庁：本州南・東岸水路誌（1964）

B 生物調査

1 対象生物（イセエビ）

a 抱卵期

（方法）

神津島におけるイセエビ漁は11月から翌年3月までの5カ月間行われ，産卵期を含む4月から10月は禁漁となっている。このため昭和57年5月25日・9月18日・58年9月7日に神津島前浜禁漁区で刺網によりイセエビを捕獲し抱卵状況を調査した。

（結果および考察）

表22 イセエビ抱卵状況

調査年月日	捕獲数		雌の甲長 cm		抱卵尾数	抱卵率 %
	雄	雌	範囲	平均		
57・5・25	116	40	4.93～8.55	6.83	40	100
9・18	224	118	3.86～7.77	5.72	0	0
58・9・7	203	39	4.34～8.02	6.61	1	2.6

57年5月25日には抱卵率100%で卵は全て橙色を呈していた。57年9月18日には抱卵率0%，58年9月7日には39尾中1尾が抱卵し卵は暗赤色を呈していた。

これらの結果から5月25日には既に抱卵盛期に入り，9月7日にはほぼ孵化が終り，9月18日には完全に終了したと思われる。また卵は孵化が近づくに従って透明度を増し全体に黒ず

んで来るが5月の卵は全て鮮かな橙色を呈し孵化直前の状態ではなく、産卵は5月上旬～中旬に始まったものと思われる。

昭和26年の伊豆大島・新島・式根島・神津島における調査によれば、抱卵期は5月中旬²⁾～9月上旬、盛期は6月下旬～8月上旬であり、昭和28年大島の調査ではこれより遅れ6月初旬に産卵が始まっている。³⁾五十嵐・永野はこの産卵始期の遅延を低水温によるものと考え、⁴⁾産卵開始には水温が19℃で安定することが必要であると、Nakamuraは千葉県小湊において早期の水温上昇がイセエビの産卵始期を始めることを報告している。

表23 神津島定置水温(前浜)

	℃		
	昭和57年	平 年	平 年 差
4 月 上 旬	17.3	16.9	+0.4
中 旬	19.1	17.0	+2.1
下 旬	20.5	17.7	+2.8
5 月 上 旬	20.6	18.7	+1.9
中 旬	22.1	19.1	+3.0
下 旬	22.0	19.9	+2.1

本調査では5月下旬には既に抱卵率100%で盛期に入っており、これまでの同島および隣接海域における調査と比べ産卵期が早まっているが、57年4月～5月にかけての旬別水温をみると(表23)、平年より0.4～3.0℃高く、このことが産卵始期を早めているものと思われる。これらのことから神津島における抱卵期は水温年変動に影響され変動するが、禁漁期内の5月上旬～9月上旬の範囲内にあると考えられる。

近県の抱卵盛期をみると、静岡県南伊豆地区では6月下旬～8月上旬、⁵⁾神奈川県三崎では7月上旬～8月上旬⁶⁾であり、また八丈島では4月下旬から産卵が始まり5月中旬から盛期⁷⁾に入るといふ。神津島における抱卵盛期は八丈島に近く、南伊豆・三崎よりは早くなっている。

b. フィロゾマ・ブエルルス(沖合調査)

(方 法)

昭和58年7月4日～8月23日にかけて4回伊豆大島周辺でプランクトンネットの夜間表層曳を実施した(表24)。ネットの口径は1m、長さ3.3m、網の目合2.5mm、底管は口径9cm、長さ30cmで底部は完全に閉じている。曳網は調査船「かもめ」3.87tの両側から行い、曳網速度3ノット、曳網時間1回10分であった。

表 24 ネット調査実施状況

調査年月日	調査場所	曳網開始時間	曳網終了時間	曳網回数
58. 7. 4	大島 千波沖	18 : 25	21 : 01	10
7. 29	〃	18 : 12	21 : 00	10
8. 9	大島東～北東	18 : 07	21 : 30	11
8. 23	大島西	18 : 22	21 : 37	11

(結果)

4回の調査を通じてイセエビのプエルルスは採集できなかった。

フィロゾマは合計42尾採集され、このうちイセエビ属フィロゾマは10尾、それ以外のフィロゾマ32尾であった(大島⁸⁾により査定)。イセエビ属フィロゾマの体長は1.8～2.2mmの小型群(4尾)と1.3.1～2.1.3mmの大型群(6尾)に分けられ、イセエビのフィロゾマ各ステージの特徴(井上⁹⁾)にあてはめると、小型群は初期フィロゾマ・大型群は後期フィロゾマと考えられる。

初期フィロゾマの採集位置は大島風早崎～乳が崎沖合1km、後期フィロゾマは大島千波沖3～9kmであった(図31)。

(考察)

フィロゾマ

イセエビ属フィロゾマは既に本邦沿岸から数多く採集され(8, 10, 11, 12, 13), 採集場所は沿岸から沖合に至る広い海域に渡っている。また*P. cygnus*・*P. interruptus*のフィロゾマについても沖合に広く分布することが知られている(14, 15, 16)。

イセエビのフィロゾマ期間については明らかにされていないが、*P. cygnus*では9～11カ月¹⁴⁾、*P. interruptus*では約7 $\frac{3}{4}$ カ月¹⁶⁾とされ、イセエビも両種に近い長期の幼生期間を持つ可能性が強い。仮に沿岸で孵化した幼生が沖合に拡散する過程で黒潮にとり込まれたとすると、約10カ月のフィロゾマ期間中に本州から数千kmも離れた外洋に運ばれることにな

図 31 フィロゾマ採集地点

り、沿岸へ帰還する可能性はきわめて低くなる。

オーストラリアの *P. cygnus* フィロゾマは孵化後すみやかに沖合へ移送されることが明らかにされているが、これら幼生の沿岸回帰と散逸の抑制に沖合の環流域が重要な働きをしている可能性が指摘されている¹⁷⁾。またカリフォルニアの *P. interruptus* では沖合40~95 Kmに運ばれた幼生は海流に乗ってさらに沖合に運ばれ資源加入することなく失われるが、それより岸側にいるもの、あるいは持続的な渦流内にあるものが沿岸資源に添加すると言¹⁸⁾う。

本邦沿岸についてみると黒潮と沿岸との間には渦流の存在が認められ、特に黒潮が蛇行する遠州灘沖にはしばしば中規模な環流が観測されている¹⁹⁾ ²⁰⁾。丸茂¹³⁾は珪藻の分布から黒潮は生育環境の境界とし、また機械的な障壁として沿岸種の南化を制約するとし、税所¹³⁾は薩南海域や徳島沿岸で採集された最終期フィロゾマについて、本邦沿岸で孵化した後黒潮流と沿岸の間にはさまれた海域でその初期生活史を送っていると推察しており、黒潮と沿岸の間の渦流域がフィロゾマの分散を抑制している可能性が強い。

一方黒潮には卵稚仔を黒潮強流域の沿岸側縁辺に吸収・輸送する作用があり²¹⁾ 黒潮北縁に²⁰⁾沿っては沿岸種の輸送効果がとくに顕著であるとされている。伊豆諸島周辺海域について²²⁾みると、藤本他²²⁾は黒潮が海嶺を乗り越える際に海嶺の影響を受けて擾乱を起し、その擾乱により主流から逸脱した漂流物が複雑に分布する島の影響で形成された地形的な渦流において²¹⁾滞留しまた沿岸域へ輸送されるとし、渡部²¹⁾は列島線西側沿いに北上し駿河湾口、遠州灘などに向い分派が形成され、卵稚仔はこの分派によって沿岸水域へ供給されるとした。

これらを総合すると、本州・伊豆諸島沿岸で孵化したイセエビフィロゾマは次第に沖合へ拡散し、一部は黒潮と沿岸の間に存在する渦流域に留まり、一部は黒潮に取り込まれ輸送される。黒潮に取り込まれたフィロゾマのうち、ある部分は黒潮の南側へ拡散し、あるいはそのまま黒潮によって本州東方へ運ばれ無効分散に終るが、一部は黒潮が伊豆海嶺へぶつかる際に起る擾乱や分派形成によって再び沿岸水域へもどされたり滞留したりする。これらの現象が繰り返され、フィロゾマの長い幼生期間中に広い分布域を持つに至るものと考えられる。

本調査で後期フィロゾマが採集された大島西方海域は黒潮北縁部に当り、調査当時0.8~1.5ノットの速い東向流が観測されている。採集されたフィロゾマは上述のように黒潮によって移送されて来たものと考えられる。同様に神津島海域も黒潮北縁部に当ることが多く同じような幼生移送が起っているものと思われる。

プエルルス

プエルルスは浮游生活を送るフィロゾマ期と沿岸底棲生活を送る稚エビ期を結ぶステージとしてイセエビ生活史のなかで重要な意味を持っている。沿岸着定後のプエルルスについて

は既に多数の標本が採集されているが、沖合域からの採集例は少なく、本調査でも採集できなかった。

しかし過去における採集例を拾うと、当分場は沿岸定線観測におけるマルチネット表層曳
で昭和52年7月御蔵島南西6.5マイルのst.12から1尾¹³⁾、税所¹⁸⁾は薩南海域の離岸5～
40Kmから37尾のイセエビ、Serfling et al²³⁾は2尾の*P. interruptus*, Phillips
et al²⁴⁾は301尾の*P. cygnus*を採集しプエルルスが沖合にも分布することが明らかになって
一方沿岸着定前のプエルルスには強い遊泳力のあることが報告されている。Phillips &
Olsen²⁴⁾は灯火を用いて*P. cygnus* プエルルスを誘引し最大遊泳速度46cm/sという値を
得、Serfling & Ford¹⁸⁾は*P. interruptus* について同様の方法で平均遊泳速度8cm/sとし
税所²⁵⁾は水槽中の観察から13～18cm/sとした。

プエルルスが遊泳力を持つことは形態的にも裏付けられ、*P. interruptus* の腹部遊泳肢
は剛毛を密生し、内肢には強い突起が生じ、その先端の鉤によって左右の遊泳肢が連結しよ
り強い推進力を得ることができるという²⁶⁾。イセエビプエルルスの遊泳肢にも後述するよう
に同様の構造がみられる(c-6)参照)。

このようにプエルルスは離岸数Km以上の沖合にも分布し、かつかなり強い遊泳力を持つも
のと考えることができる。Serfling et al¹⁸⁾は、プエルルスは過渡的な外洋性のステージで
あり、方向性を持った遊泳のために特殊化し、泳ぐことによって定着に適した沿岸の保育域
へ帰環する能力があると述べ、同様の考え方はPhillips et al¹⁷⁾によっても示されている。イ
セエビについて税所¹³⁾は、最終期フィロゾマの採集地点はいずれも陸岸より近距離(5～20
Km)にあってプエルルスへと変態後は遊泳力も500m/hと増すことにより、これらの個
体は鹿児島沿岸、薩南海域の島々に十分到達できるとした。

黒潮の流速は既往知見にみるプエルルス遊泳力を上回るもので、黒潮に逆らって沿岸域に
向うことは不可能であるが、流れを横断するように泳ぐことによって沿岸に到達することは
十分可能であると思われる。黒潮と沿岸の間に分布し、また黒潮北縁に沿って本州沿岸を移
送される最終期フィロゾマは、プエルルスに変態後海流の影響を受けつつ泳いで浅海岩礁帯
に到達するものと考えられる。

c. プエルルス・稚エビ(沿岸調査)

プエルルス・初期稚エビの沿岸での採集についてはこれまで多くの報告が成されている。
木下²⁷⁾は夜間燈下に集まるものをすくいとり、岡田・久保²⁸⁾は湾内寄藻中から、静岡水試⁵⁾
はテングサ漁獲物中から、高知水試²⁹⁾は海岸にうち上げられた海藻中から採集し、石山は浜
名湖口において夜間シラス鰻網で捕獲している。またプエルルス・稚エビは真珠養殖いかだ

・真珠採苗器・ヒオウギ養殖カゴ・エビ活簀などに集まることが知られ、人工採集器による捕獲も数多く試みられている (5, 18, 29, 30, 31)。伊豆諸島では古くからヒラクサ (*Gelidium subcostatum* OKAMURA) 中に生息することが知られ、また造礁サンゴ中に生息するとも言われて来たが、定量的調査は行われていなかった。これらの知見をふまえて、(1)採集器の設置、(2)造礁サンゴ採取、(3)寄藻採取、(4)ヒラクサ採取 (5)雑藻 (ヒラクサ以外の海藻) 採取、によつてプエルルス・稚エビの採集を試みた。

1) 採集器

(方法)

既往知見によれば採集器によるプエルルス幼生捕獲例は外海域よりも内湾域に多いため、大島波浮港内8地点に採集器を設置した (図32)。設置地点の水深は2~5m、底質は砂泥・礫・転石で全て底層に設置した。

図32 採集器設置地点

採集器として鉄棒型と杉枝型の2型を用い (図33)、昭和57年6月9日から8月3日の間各地点に両採集器を設置し、2~7日おきに引揚げた。

(結果および考察)

鉄棒型採集器では7月1日 st.2 でプエルルス1尾、7月28日 st.5 で初期稚エビ1尾を採集したが、杉枝型では1尾も採集できなかった。採集数の少ない原因としては港口域の藻場が良好な幼生着定場となっており、港内に到達する以前に着定してしまうことが考えられる。また港内にも海藻が着生し寄藻も多いため、プエルルスがこれら天然のすみ場に分散してしまうことも採集器に集まらない原因のひとつと思われる。

図33 プエルルス採集器

2) 造礁サンゴ採取

(方法および結果)

昭和58年8月2日三宅島阿古の水深5~10 mにおいて石サンゴ類を採集・観察し、ブエルルス・稚エビの有無を調査した。採取した石サンゴは枝間の空隙に富む *Acropora* spp. 群体直径は9~40 cm, あらかじめ袋で覆った後根本を割って採取した。また目視により, 石サンゴ・ソフトコーラル・トゲトサカ・サンゴイソギンチャク等を潜水観察した。

採集した石サンゴ10群体および目視観察による43群体からブエルルス・稚エビは発見できなかった。

3) 寄藻採取

(方法および結果)

昭和57年7月7日大島波浮港内テトラポット付近の寄藻場で潜水観察しブエルルス・稚エビを探索した。7月9日同地点および燈台脇の寄藻約5 m³(水中状態)を蚊帳で旋き陸上に運んだ後, 寄藻中の動物を査定した。両調査ともブエルルス・稚エビは発見できなかった。

4) ヒラクサ採取

(方法)

昭和57年7月24日~10月26日に9回, 58年4月4日~12月16日に40回神津島および大島でヒラクサを採取した。採取水深は10~25 m, 採取法は潜水による徒手採取でヒラクサは大スカリ(口径35 cm, 網のストレッチ目合8 cm)にそのまま入れたが, 57年調査の一部と58年調査ではスカリの内側を目合の細かいネットで覆いブエルルス・稚エビの逃亡を防いだ。1回の採取量は調査日ごとに異なり湿重量で28~428 Kg, 採取したヒラクサは陸上に運び1株ずつよく振って葉中の動物を収集した。

(結果および考察)

昭和57年にはブエルルス33尾, 初期稚エビ21尾(表25), 58年にはブエルルス193尾, 稚エビ151尾(表26), 合計398尾を採捕しブエルルス・稚エビがヒラクサ中に多数生息することが判明した。

(1) ブエルルス出現期

昭和57年の調査は7月24日に開始しその時既に5尾のブエルルスが確認されたため出現始期は特定できないが, 最後のブエルルス採捕日は9月30日で10月14日以降は採集されていないことから出現終期は9月下旬~10月上旬と推定される。

58年には6月3日にはじめて第I期稚エビが採捕されていることからプエルルス出現始期は5月下旬と考えられ、また10月17日以降は採捕がなく終期は10月上～中旬と考えられる。野中他³³⁾はそれまでの資料を総合しプエルルス出現期を4月下旬～12月下旬としており、本調査ではこれよりかなり短い期間であった。

出現盛期についてみると、水深16m以浅のヒラクサ100kg当りプエルルス尾数(図34)は8月中旬～9月上旬にピークが現れこの期間が盛期と考えられる。

月令との関係を見ると満月以後9日以内に著しい出現量の落込みがあり、逆に新月以後5日以内に増加が認められるが6月24日・9月2日には上記の範囲から外れるピークがみられ、新月期の着定量増より満月期の減少が顕著であった。

初期稚エビは6月3日～10月17日に出現しピークは8月4日 8月26日、9月17日にみられるが、プエルルスに比べ出現期は若干長く、また月令と出現量の相関は認められなかった(図34)。

(2) 水深別出現量

ヒラクサは後述するように(2-c参照)水深10m以浅にはほとんど着生しないため、水深10～16mおよび20m付近で採取を行った。大島海域における両水深のプ

図34 プエルルス・稚エビの日別出現量
(水深16m以浅ヒラクサ中)

● 新月
○ 満月

表 2.5 昭和57年ヒラクサ中ブエルルス・稚エビ採捕数

調査年・月・日	調査場所	採取水深 m	ヒラクサ 採取量 湿重量Kg	採捕尾数 (尾)				ヒラクサ100Kg当り尾数(尾)		
				ブエル ルス	第Ⅰ期 稚エビ	第Ⅱ期以 降稚エビ	合計	ブエル ルス	稚エビ	合計
7・24	大島・泉津	1.5	28	5	0	0	5	17.9	0	17.9
29	大島・泉津	1.2~1.5	30	0	0	0	0	0	0	0
8・11	神津島・牛鼻	1.2	87	5	6	3	14	5.7	10.3	16.1
24	大島・黒崎	1.4~2.0	231	13	4	1	18	5.6	2.2	7.8
9・8	大島・河の沢	1.5~2.0	131	6	2	5	13	4.6	5.3	9.9
18	神津島・長浜・ 牛根	1.5~2.1	62	2	0	0	2	3.2	0	3.2
30	大島・ハカバ下	2.0	147	2	0	0	2	1.4	0	1.4
10・14	大島・黒崎	1.5~2.0	72	0	0	0	0	0	0	0
26	大島・ハカバ下	2.0	74	0	0	0	0	0	0	0
計				33	12	9	54			

表 2 6 昭和 5 8 年ヒラクサ

調査月・日	調査場所	採取水深	ヒラクサ採取量	プエルルス	
		m	湿重量 Kg		
4・4	大島・河の沢	15~17	87		
18	波浮	20	77		
26	神津島・牛鼻	15~20	166		
5・14	大島・泉津	13~20	130		
15	神津島・牛根	12~20	45		
20	大島・泉津	15~20	129		
27	波浮	20	101		
6・3	岡田	15	167		
9	神津島・牛鼻	15~20	176		
16	大島・岡田	15	221	2	
24	岡田	12~15	239	5	
7・1	岡田	10~15	243		
13	河の沢	15~18	196	4	
18	岡田	11~13	204	4	
25	泉津	15~20	129	1	
8・1	岡田	12~15	229	4	
4	神津島・牛鼻	15~20	216	6	
8	大島・泉津	13~23	428	23	
12	泉津	13~21	147	17	
19	泉津	13~21	186	18	
22	泉津	10~25	319	38	
25	神津島・牛鼻	13~20	189	2	
26	大島・泉津	15~20	154	7	
29	泉津	15~20	181		
9・2	泉津	15~20	167	20	
5	泉津	10~20	211	7	
12	泉津	12~20	187	11	
17	波浮	10~15	105	7	
19	神津島・牛根	15~20	65	1	
22	大島・岡田	10~15	196	5	
10・1	泉津	15~20	120		
10	波浮	12~14	98	11	
17	波浮	10~14	120		
22	波浮	10~15	48		
31	河の沢	15~20	99		
11・11	波浮	10~13	124		
21	岡田	12~15	132		
12・3	泉津	10~19	97		
9	波浮	12~15	92		
16	波浮	12~15	90		
計				193	

中プエルルス・稚エビ採捕数

採 捕 尾 数 (尾)			ヒラクサ100Kg当り尾数 (尾)		
第I期稚エビ	第II期以降 稚エビ	計	プエルルス	稚エビ	計
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
1	4	5		3.9	3.0
		0			0
1		3	0.9	0.5	1.4
3	6	14	2.1	3.8	5.9
1	2	3		1.2	1.2
2		6	2.0	1.0	3.1
9	1	14	2.0	4.9	6.9
2		3	0.8	1.6	2.3
7	1	12	1.7	3.5	5.2
8	2	16	2.8	4.6	7.4
2	2	27	5.4	0.9	6.3
4	1	22	11.6	3.4	15.0
1		19	9.7	0.5	10.2
12	3	53	11.9	4.7	16.6
6	2	10	1.1	4.2	5.3
7	1	15	4.5	5.2	9.7
3		3		1.7	1.7
10	2	32	12.0	7.2	19.2
5	5	17	3.3	4.7	8.1
3	2	16	5.9	2.7	8.6
10	7	24	6.7	16.2	22.9
		1	1.5		1.5
7	1	13	2.6	4.1	6.6
		0			0
	4	15	11.2	4.1	15.3
1		1		0.8	0.8
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
105	46	344			

エルルス・稚エビの面積当り出現量を比較すると、いずれも水深10～16mが20m付近を上回りプエルルスでは1.36倍、稚エビでは1.14倍出現している(表27)。

神津島海域では水深20m線からはプエルルス・稚エビが採捕されていない。これは恐らく調査回数が少ないためで、ヒラクサ採取量を増せば幼生は発見されるものと思われる。しかし20m線より15m線に多数のプエルルスが着定することは本調査結果から推察された。

(3) ヒラクサ中のプエルルス期間

ヒラクサ中から採捕したプエルルス標本には淡紅色や濃紅色の個体に混じって完全に透明なものが含まれる。透明プエルルスを飼育すると殻表に黄色・紅色の色素が現われ、それが次第に増加し、稚エビへ脱皮する直前には全体に濃紅褐色を呈する。従って採集後第I期稚エビへ脱皮するまでの期間は透明なプエルルスで最も長くなる。

18) Serfling et al は新しく定着したプエルルスは全て透明で、潮間帯生物と共に飼育するとすみやかに着色が起ることを述べている。これらのことから透明プエルルスの稚エビまでの脱皮期間をヒラクサ中プエルルス期間と考えることができる。

表28 大島トウシキ58年水温

		℃				
旬	6月	7月	8月	9月	10月	
上旬	21.5	23.0	24.9	25.9	24.2	
中旬	21.7	23.5	25.2	24.7	23.0	
下旬	22.3	23.7	24.7	23.7	22.2	

採捕された透明プエルルスを飼育した結果稚エビまでの脱皮期間は5～11日であったが、季節別にみると、6月中旬10～11日(2例)、7月中旬～8月上旬7日(4例)、8月中旬～9月上旬5～6日(7例)となっている。なおこれ以外の季節には生きのまま採捕された透明プエルルスはなかった。

第I期稚エビまでの脱皮期間を大島旬別水温(表28)と比較すると両者は明らかに相関し、低温期に長く高温期に短くなっている。透明プエルルスの採捕されていない時期の脱皮期間を水温から推定し、6月中旬～10月中旬のヒラクサ中プエルルス期間を表29のように考えた。

(4) プエルルス期数

34) 沿岸着定後のプエルルス期数については岡田他が体色から3期に分けているが、体

色は徐々に変化し個体差もあるため各期の境界は必ずしも明瞭でない。ここではⅠ期：完全に透明なものⅡ期：頭胸部が着色し腹部が透明なもの、Ⅲ期：頭胸部腹部とも着色しているものに分け、各期別採集数を調べた(表30, 31, 32)。

(5) プエルルス着定量

ある時点でヒラクサ中に生息するプエルルスは表29の期間を経過すると全て稚エビに変態する。従ってこの間隔でヒラクサ中のプエルルス数を集計すれば年間プエルルス着定量を推定することができる。

実際の採取調査間隔は表29と一致しないが比較的間隔の近い調査日を選びかつ補正を行って推定値を求めた(表33)。

(補正の方法)

まず透明プエルルス(Ⅰ期)が着色しⅡ期になるまでの期間を次のように仮定する。6月中旬3日, 6月下旬~8月上旬2日, 8月中旬~9月上旬1日, 9月中旬~10月中旬2日。

ある採集日前後の1日当りプエルルス着定数は、採集された透明プエルルス数(表31のⅠ期)を上記日数で除した値と考えることができる。

採集日間隔が表29のプエルルス期間と一致しないとき、くい違ひ日数に応じて1日当りプエルルス着定数を加減した。

大島海域の水深10~16mではヒラクサ100Kg当り年間101.06尾着定するという結果を得た。ヒラクサ着生量は水深10~15mで平均0.57Kg/m²であることから面積当りプエルルス年間着定量は0.576尾/m², 水深20mでは0.576/1.36=0.424尾/m²と推定された(水深別出現量比1.36については(2)参照)。なおこの推定には異なる採取地点のデータを一括して用いるなどさらに検討する必要のある問題も含まれている。

表29 ヒラクサ中のプエルルス期間

月	旬	プエルルス期間(日)
6	中	10
	下	9
7	上	8
	中	7
	下	7
	8	上
	中	6
	下	6
9	上	6
	中	7
	下	7
	10	上
	中	8

表 27 昭和58年水深

調査月・日	場 所		水 深 1 0 ～ 1 6 m					
			ヒラクサ 採取量Kg	ブエルルス		稚 エ ビ		尾 数
				尾 数	尾数/ ヒラクサ*	尾 数	尾数/ ヒラクサ	
7・25		シ オ フ キ	52	0	0	1	1.92	1
8・12		鉄 砲 場	64	13	20.31	3	4.69	16
19		秋 の 浜	80	15	18.75	1	1.25	16
26	大島	"	50	1	2.00	7	14.00	8
29	泉津	"	82	0	0	3	3.66	3
9・2		鉄 砲 場	78	11	14.10	5	6.41	16
5		"	115	4	3.48	6	5.22	10
12		"	98	7	7.14	2	2.04	9
計					65.78		39.19	
8・4		神津島・牛鼻	79	6	7.59	10	12.66	16
25		" "	88	2	2.27	8	9.09	10

* ヒラクサ100Kg当り尾数

** 主として水深20m, 最大範囲18~21m

注 水深別の面積当り出現量比は両水深の単位ヒラクサ量当り尾数比に, ヒラクサ着生
 $65.78 / 31.40) \times (0.57 / 0.88) = 1.36$, 稚エビは $(39.19 / 22.$

別プエルルス・稚エビ数

計	水深 20 m **						計	
	ヒラクサ 採取量Kg	プエルルス		稚エビ		尾数		尾数/ ヒラクサ
		尾数	尾数/ ヒラクサ	尾数	尾数/ ヒラクサ			
1.92	77	1	1.30	1	1.30	2	2.60	
25.00	82	4	4.88	2	2.43	6	7.32	
20.00	106	3	2.83	0	0	3	2.83	
16.00	105	6	5.71	1	0.95	7	6.67	
3.66	99	0	0	0	0	0	0	
20.51	89	9	10.11	7	7.87	16	17.98	
8.70	96	2	2.08	6	6.25	8	8.33	
9.18	89	4	4.49	3	3.37	7	7.87	
104.97			31.40		22.17		53.60	
20.25	137	0		0		0		
11.36	101	0		0		0		

量比 (15 m / 20 m = 0.57 / 0.88, 2-c 参照) を乗じて求めた。プエルルスは
 $1.7) \times (0.57 / 0.88) = 1.14$

表 3 0 プエルルス・稚エビ期別

調査月・日	調査場所	プエルルス*				計	I
		I	II	III	計		
6・3	岡田・小口				0	1	
9	神津・牛鼻				0		
16	岡田・小口	1		1	2	1	
24	小口	2		3	5	3	
7・1	小口				0	1	
13	差木地・河の沢	1	2	1	4	2	
18	岡田・小口	1		3	4	9	
25	泉津・潮吹				0	1	
8・1	岡田・小口	2	2		4	7	
4	神津・牛鼻	3	1	2	6	8	
8	泉津・二本松	6	10	7	23	2	
12	鉄砲場	1	5	7	13	2	
19	秋の浜	3	7	5	15	1	
22	二本松	7	20	11	38	12	
25	神津・牛鼻			2	2	6	
26	泉津・秋の浜			1	1	6	
29	秋の浜				0	3	
9・2	鉄砲場	3	6	2	11	4	
5	鉄砲場		1	3	4	3	
12	鉄砲場	3	1	3	7	1	
17	波浮・カキハラ		2	5	7	10	
19	神津島・長浜			1	1		
22	岡田・小口鼻	1	2	2	5	7	
10・1	泉津・秋の浜				0		
10	波浮・カキハラ	1	4	6	11		
17	波浮・カキハラ					1	
計		35	63	65	163	91	

* 期数については c-4) -(4)参照

** " c-7) 参照

採集数 水深10～16m 58年 尾

初期稚エビ**					I 令	合計	ヒラクサ採取 量湿重量Kg
II	III	IV	V以上	計			
				1	4	5	167
				0		0	176
				1		3	221
3				6	3	14	239
				1	2	3	243
				2		6	196
	1			10		14	204
				1		1	52
1				8		12	229
2				10		16	79
1	1			4		27	428
1				3		16	64
				1		16	80
3				15		53	319
	2			8		10	88
		1		7		8	50
				3		3	82
1				5		16	78
2	1			6		10	115
1				2		9	98
2	3	2		17		24	105
				0		1	6
1				8		13	196
				0		0	120
	1	1	2	4		15	98
				1		1	120
18	9	4	2	124	9	296	

表31 プエルルス・稚エビ採集数(ヒラク)

調査月・日	調査場所	プエルルス				計	I
		I	II	III			
6・3	岡田・小口				0	0.60	
9	神津・牛鼻				0		
16	岡田・小口	0.45		0.45	0.90	0.45	
24	小口	0.84		1.26	2.09	1.26	
7・1	小口				0	0.41	
13	差木地・河の沢	0.51	1.02	0.51	2.04	1.02	
18	岡田・小口	0.49		1.47	1.96	4.41	
25	泉津・潮吹				0	1.92	
8・1	岡田・小口	0.87	0.87		1.75	3.06	
4	神津・牛鼻	3.80	1.27	2.53	7.59	10.13	
8	泉津・二本松	1.40	2.34	1.64	5.37	0.47	
12	鉄砲場	1.56	7.81	10.94	20.31	3.13	
19	秋の浜	3.75	8.75	6.25	18.75	1.25	
22	二本松	2.19	6.27	3.45	11.91	3.76	
25	神津・牛鼻			2.27	2.27	6.82	
26	泉津・秋の浜			2.00	2.00	12.00	
29	秋の浜				0	3.66	
9・2	鉄砲場	3.85	7.69	2.56	14.10	5.13	
5	鉄砲場		0.87	2.61	3.48	2.61	
12	鉄砲場	3.06	1.02	3.06	7.14	1.02	
17	波浮・カキハラ		1.90	4.76	6.67	9.52	
22	岡田・小口	0.51	1.02	1.02	2.55	3.57	
10・1	泉津・秋の浜				0		
10	波浮・カキハラ	1.02	4.08	6.12	11.22		
17	波浮・カキハラ				0	0.83	

* 期数についてはc-4) (4)参照

* " c-7) 参照

サ100Kg当り)水深10~16m 58年 尾/ヒラクサ100Kg

初期稚エビ					I 令	計
II	III	IV	V以上	計		
				0.60	2.40	2.99
				0		0
				0.45		1.36
1.26				2.51	1.26	5.86
				0.41	0.82	1.23
				1.02		3.06
	0.49			4.90		6.86
				1.92		1.92
0.44				3.49		5.24
2.53				12.66		20.25
0.23	0.23			0.93		6.31
1.56				4.69		25.00
				1.25		20.00
0.94				4.70		16.61
	2.27			9.09		11.36
		2.00		14.00		16.00
				3.66		3.66
1.28				6.41		20.51
1.74	0.87			5.22		8.70
1.02				2.04		9.18
1.90	2.86	1.90		16.19		22.86
0.51				4.08		6.63
				0		0
	1.02	1.02	2.04	4.08		15.31
				0.83		0.83

表 3 2 プエルルス・稚エビ期数

調査月・日	調査場所	プエルルス*				計	I
		I	II	III	計		
7・25	泉津・潮吹		0		1	1	
8・12	鉄砲場	1		3	4	2	
8・19	秋の浜	2		1	3		
8・26	秋の浜	2		4	6	1	
8・29	秋の浜				0		
9・2	鉄砲場	4	3	2	9	6	
9・5	鉄砲場	1	1		2	2	
9・12	鉄砲場	1	2	1	4	2	
計		11	7	11	29	14	

* 期数については c-4) (4)参照

** " c-7) 参照

別採集数 水深20m 58年

尾

初期稚エビ**					合計	ヒラクサ採取量 湿重量 Kg
II	III	IV	V以上	計		
				1	2	77
				2	6	82
				0	3	106
				1	7	105
				0	0	99
1				7	16	89
1				3	5	96
1				3	7	89
3				17	46	

表 3 3 プエルルス年間着定量 水深10～16m

調査月・日	調査日間隔	補正日数	尾数/ヒラクサ*	1日当り* 着定数	補正值
6・16	8	-2	1.14	0.19	
24	7	-2	2.09	0.42	-0.84
7・1	12	4	0	0	0
13	5	-2	2.04	0.26	1.04
18	7	0	1.96	0.25	-0.50
25	7	0	0	0	0
8・1	7	0	1.74	0.44	0
8	4	-3	5.37	0.70	0
12	7	1	20.31	1.56	-4.68
19	7	1	18.75	3.75	3.75
26	7	1	2.02	0	0
9・2	10	4	14.08	3.84	3.84
12	10	3	7.17	1.54	6.16
22	9	2	2.55	0.26	0.78
10・1	9	2	0	0	0
10			11.27	0.51	1.02
計			90.49		10.57

* ヒラクサ100Kg当りの尾数

(6) 地域別着定量

本調査では同時に数地点からの採集を行っていないため正確な地先別比較はできないが、ヒラクサ100Kg当りプエルルス数が10尾を越える大島泉津秋の浜、泉津鉄砲場、泉津二本松、波浮カキハラの4地点を比べると(図35)海岸線が顕著に湾入している地点はカキハラだけで他の3地点は若干の湾入はあるもののほとんど外洋に面していると言ってよい。従って伊豆諸島においてはプエルルスは海岸線湾入部だけでなく外海域にも多数着定すると考えられる。

採集器を用いた各県採集例をみると、長崎水試⁵⁾ 高知水試²⁹⁾ 宮崎水試²⁹⁾ は内湾の流れの

図35 ヒラクサ採取地点

滞留あるいは収斂する場所、波浪なく流れの穏やかな場所で採捕されるとし、静岡水試⁵⁾和歌山水試³⁰⁾は外海域からの採集を報じている。採集器に対するプエルルス²⁹⁾の集量は周辺の着定基質の量や採集器の破損によって影響を受けるものと考えられ、採集器による着定量比較を行う場合にはこの点の検討が必要であると思われる。

海藻中からの採集例をみると高知水試²⁹⁾は外洋に面する海岸に打上げられた海藻中からプエルルス・稚エビを採集し本調査結果と一致した。

(7) ヒラクサ中の稚エビ

初期稚エビの期数を後述する方法(c-7)参照)により推定し、58年にヒラクサ中から捕獲された稚エビの期数別出現数をみると、第Ⅰ期105尾、第Ⅱ期22尾、第Ⅲ期9尾、第Ⅳ期4尾、第Ⅴ期以上2尾、I令9尾となり、第Ⅰ期に比べ第Ⅱ期以降の稚エビ数は激減している(表30, 32)。このことからヒラクサ中でプエルルスから変態した稚エビの多くはしばらくヒラクサ中に留った後次第にヒラクサ外へ移動してい

くものと考えられる。

ヒラクサから出た稚エビのすみ場所に関する調査は行っていないが、道津他³⁵⁾は直径1 m大の丸石を積んだ防波堤礎石部に体長7 cm以下の稚エビ多数が確認できていることから、恐らくヒラクサ周辺の岩間に生息するものと思われる。

6月から7月にかけては甲長2 cm前後のI令エビが採集され(表30), これらは一度周辺岩礁へ移動した個体が再びヒラクサ中に入ったものと考えられ, 同じようなヒラクサー岩礁間の移動は当歳エビについても起っていると思われる。

5) 雑海藻採取

(方法)

ヒラクサ以外の海藻について昭和57年7月29日から58年9月19日にかけて9回採取調査を行った。潜水により海藻を徒手採取し, 陸上でよく振って藻中動物を採集した。テングサ類の一部については漁業者が採取した漁獲物を検査した。

表34 雑海藻中のプエルルス

調 年 月・日	採取場所	水深m	海 種	採取量 Kg	プエル ルス数	備 考
57・7・29	大津・泉津	10	マクサ	4.3	0	
8・24	黒崎	15	マクサ・オオブサ・オバクサ	3.6	0	
"	"	20	"	3.5	0	
9・8	河の沢	15	マクサ	4.2	0	
58・7・8	野増	10	モク類	53.7	0	周辺にヒラクサ分布せず
"	"	15	タマイタダキ・シワヤハズ・トゲモク	8.9	1	
19	泉津	5~10	マクサ・オオブサ	30	0	漁獲物
22	泉津	"	"	25	0	"
8・12	泉津	"	キントキ	25.8	0	
29	泉津	4~6	シワヤハズ	15.7	0	
"	"	1~9	マクサ・オオブサ	10.0	0	
9・19	神津島・牛根	15	タマイタダキ	7.5	0	

(結果および考察)

テングサ類(マクサ・オオブサ・オバクサ)は湿重量80.6Kgを検査したが、ブエルルス・稚エビは発見できなかった(表34)。大島のテングサ漁業者によれば、58年5月中旬にテングサ漁獲物約100Kgの中から数尾の稚エビを発見し、また8月中旬には水深5m以浅のオオブサ中からブエルルス1尾を確認したとのことである。しかしテングサ乾燥作業中に発見されるブエルルス・稚エビ数はヒラクサ中に最も多く、その他のテングサ類ではほとんど確認できないという。

テングサ以外の海藻についてみると、大島・野増のタマイタダキ・シワヤハズ・トゲモク(混獲)中から1尾のブエルルスを採集し、これらの海藻にも着定することが確認されたが、これ以外のモク類・キントキ・シワヤハズ・タマイタダキからは発見できなかった。雑藻中に幼生を確認した野増地先にはヒラクサが分布せず、その他の調査地点には豊富に着生している。

これらのことから、ヒラクサが着生する海域ではブエルルスの大多数はヒラクサ中に生息し、その他の海藻には少数が入藻するに留まるものと思われる。言い換えればブエルルスはヒラクサを好み伊豆諸島においてはヒラクサ場が最も有効なブエルルス着定場になっていると考えられる。

6) ブエルルス遊泳肢の構造

(方法)

ヒラクサ中から採集したブエルルスと第I期稚エビの腹部遊泳肢形態を顕微鏡下で比較した。

(結果および考察)

イセエビ腹部遊泳肢の形態については中沢³⁶⁾岡田・久保²⁸⁾によって既に報告されているが、遊泳能という点から改めて見直すと、ブエルルス遊泳肢は原節基部から外肢先端までの長さが第I期稚エビの1.7倍に達し、内外両肢は強く長い羽状剛毛を備える。内肢内側には棒状の内突起があり、その先端内側には十数本の鉤刺を密生する。向い合った左右の内突起はその先端部を接することにより鉤刺がからまり互に連結することができる。遊泳肢内部には縦に繊維状組織が走り各部を支持している。

一方第I期稚エビは原節・内外肢とも収縮し特に原節・内肢で著しい。内肢剛毛は消失し、外肢剛毛も短く弱くなっている。内突起先端の鉤刺は消失し左右の遊泳肢は連結できない。遊泳肢内部の繊維状組織はみられない。

両者の遊泳肢にみられるこのような形態的相違は、ブエルルスが稚エビに比べ高い遊

泳能を持つことを示しているように思われる。

A 第Ⅰ期稚エビ B・C プエルルス

1. 原節 2.外肢 3. 内肢 4. 内突起 5. 鉤刺

図36 第Ⅲ腹節遊泳肢形態(剛毛の羽毛は省略)

7) 初期稚エビの期数査定

初期稚エビの期数について木下²⁷⁾ は体色から、岡田・久保²⁸⁾ は第1触角鞭状部節数から査定を試みている。第Ⅰ期稚エビは甲が全体に褐色を帯び腹部背面に明瞭な白斑が現れることから容易に識別できるが、第Ⅱ期以後甲は紅色を呈し腹部白斑は不明瞭となるため体色からの査定は難しい。そこで触角節数に基いた岡田の方法を用いてヒラクサ中から採集した稚エビの期数査定を試みた。

(方法)

ヒラクサ中から採集した稚エビと、飼育により期数の判明している稚エビの甲長・第1触角鞭状部節数を解剖顕微鏡下で計測した。節数計測は主として右触角を用い、飼育個体では脱皮殻を計測した。

(結果および考察)

第1触角内鞭は先端部欠損がしばしばみられるため外鞭について結果の検討を行う。

飼育により期数の判明している稚エビ節数は、Ⅰ期20~24、Ⅱ期26~31、Ⅲ期

35~41, V期55であり(図37)標本数は少ないものの明らかに各期の節数は分離している(V期は脱皮殻破損のため未計測)

ヒラサ中から採集した稚エビの甲長組成をみると(図38)I期以外の個体は7.8~9.2, 9.9~11.2, 12.3~13.1 mmの3群から成っている。前2群の第1触角外鞭節数は飼育エビのII期, III期節数とほぼ一致するため, 各群はそれぞれII期, III期, IV期稚エビに相当すると思われる。これに殻色から判断したI期稚エビを加え各期外鞭節数を示すと, I期19~25, II期26~33, III期34~41, IV期42~²⁸⁾と考えることができる。岡田他はI期22~25, II期26~34とし今回の結果とほぼ一致している。

以上のように初期稚エビの第I触角外鞭節数は各期ごとに異なり, かつ甲長についても分離が認められるため, 両者を総合して稚エビ期数を査定し得ると考えられる。

図37 初期稚エビの甲長と触角節数

図38 初期稚エビの甲長組成(58年, ヒラクサ中)

点線: 第I期稚エビ

8) ブエルルス・稚エビの甲長

(方法)

採捕したブエルルスおよび初期稚エビの甲長をポイントノギスを用いて測定した。稚エビの期数は前項で述べたように第1触角外鞭節数と甲長から査定した。

(結果および考察)

58年調査における平均甲長はブエルルス7.41mm, 第I期稚エビ7.46mm, 第II期稚エビ8.66mm, 第III期稚エビ10.44mm, 第IV期稚エビ12.78mmであった(表35)。

表35 ブエルルス・稚エビ甲長(58年)

	ブエルルス	稚エビ			
		I期	II期	III期	IV期
測定数	174	104	22	9	4
範囲 mm	6.8 ~ 8.1	6.8 ~ 8.2	7.8 ~ 9.2	9.8~11.2	12.3~13.1
平均 mm	7.41	7.46	8.66	10.44	12.78

測定標本のうちブエルルス1尾は雑藻中から, 残りは全てヒラクサ中から採捕したもので, 天然における初期稚エビの甲長を示している。

木下²⁷⁾ はブエルルスを飼育することにより各期甲長を求めI期7.4, II期8.1mmとし, 大島⁶⁾ は体色による期数判定からI期8.1, II期9.6, III期11.5mmとし, また道津他³⁷⁾ は脱皮前と脱皮後の甲長変化に基づいてI期6.0~7.5, II期7.6~9.0, III期9.1~10.5, IV期10.6~11.0mmとしている。本調査の結果は木下, 道津の値と, 大島の値の中間にあり, 必ずしも良く一致していないため, さらに資料を蓄積する必要がある。

9) ブエルルス・稚エビの飼育

(方法)

大型コンクリート水槽中に1辺10cmの立方体プラスチックネット籠を設置し, この中に採集したブエルルス・稚エビを1尾ないし2尾収容し魚肉・アミ餌投与により飼育した。毎日脱皮の有無を観察し, 脱皮が確認された場合は脱皮殻について甲長・第1触角鞭状部節数を計測した。飼育期間は57年には7月1日~12月15日, 58年には6月16日~10月16日である。

(結果および考察)

甲長・第1触角鞭状部節数については7)で、透明プエルルス²⁷⁾の脱皮期間については4) - (3)で既に述べた。

I期・II期・III期の稚エビ期間は57年にはそれぞれ27.3, 24.3, 26.3日, 58年には22.5, 21.9, 31.7日であった(表36)。第I期稚エビ期間について木下²⁷⁾は18~25日平均21日, 道津他³⁷⁾は11日前後としており, かなり大きな違いが認められる。脱皮間隔は水温, 餌料条件, 飼育密度等に影響されることが報告されており³⁸⁾ 前述の違いは飼育条件の違いによるものと思われる。

表36 初期稚エビ脱皮間隔

稚エビ 期数	昭和57年			昭和58年		
	測定数(尾)	範囲(日)	平均(日)	測定数(尾)	範囲(日)	平均(日)
第I期	8	21~36	27.3	23	15~31	22.5
第II期	4	20~27	24.3	8	13~32	21.9
第III期	4	23~32	26.3	3	29~36	31.7

d 成エビのすみ場所

(方法)

昭和57年9月17日神津島西側の図39に示す3地点(一ノ首・前浜岸壁・牛根)において成エビのすみ場所を潜水観察した。一ノ首は水面上から急傾斜で落ち込む崖であり, 観察水深は2~20m, 前浜岸壁は沖に突き出した汽船着岸岸壁で, ケーソンと被覆ブロックで構成され, 最深部で水深10m, 牛根は大中の根石帯, 観察水深は3~15mの場所である。

図 3 9 調査地点

(結果および考察)

一ノ首はほとんど垂直に近い切り立った崖が水面上から続き水深 3 0 m 付近の底に達する。底部の傾斜はゆるやかで、大・中根石・転石帯となる。崖は部分的に傾斜のゆるい所や棚があり、表面には種々の深さの割れ目や窪みがみられる。島の南西端に位置するため、南～南西からの潮流を受け調査時にもかなり速い北向流があった。観察結果を表 3 7 に示した。複雑な天然地形を単純に表現することは難しいが、5 尾以上の生息が認められた場所は全て奥行き 1 m 以上の割れ目で開口部の幅は最大で 2 0 ~ 5 0 cm、但し幅の広い部分にエビは少なく、2 0 cm 以下の部分に集中していた。約 3 0 尾が観察された割れ目は崖の傾斜がゆるくなった棚の部分にあり、開口部は上向き、幅 2 0 cm、長さ 2.5 m、奥行きは 1 m 以上で 1 m 以下は幅がさらに狭く屈曲して最奥部までは見通せなかった。また奥が浅い割れ目、開口部の短い割れ目、あるいは径 2 0 cm 程度の小さい窪みにも生息するが数は少なく、海藻はテングサ(マクサ・オオブサ)主体でこの他キントキ類が普通に着生し、丈の高い海藻はみられなかった。

表37 一ノ首成エビすみ場所観察結果

水深 (m)	イセエビ数(尾)	住 み 場 所
2	6以上	斜の割れ目 入口20×40cm 奥は深い
	6	” ” ”
6	1	割れ目 奥は余り深くない
9	4	大岩と大岩間のすき間 幅10～15cm
11	1	崖の縦の割れ目 幅10cm
6	2	” 幅15cm, 奥深い
4	3	” ” ”
15	1	割れ目 幅20cm 長さ1m 奥40cm
10	約30	上向き割れ目 幅20cm長さ2.5m奥1m以上 奥行き1m でさらに幅狭くなる。
3	10以上	上向き割れ目 幅5～30cm長さ3～4m奥行き1m以上 奥は複雑に入り組む
10	1	垂直壁面 やや大きな凹所の中の小さな窪み 径20cm 深さ20cm
5	4	垂直壁面の割れ目, 幅15cm長さ70cm深さ20cm
3	10以上	割れ目と穴の組合せ 入口の最広部50cm, 長さ5m, 奥行 き2m幅の狭い部分にエビ多い

前浜の汽船着岸岸壁は岸から沖に向かって200m突き出したケーソン列とケーソン基部捨て石の流出を防ぐ被覆ブロックで構成されている(図40)。被覆ブロックはコンクリート製で3.5×4.0×1.0mと2.5×2.5×1.0mの2種があり、図40のように割り石を押えているため、海底とブロック間には割石をはさんで複雑な空間が造られている。またケーソンの継ぎ目には狭い割れ目ができており、かなり奥の深いものもみられる。被覆ブロック域ではブロックと海底の間に最もエビが多く、一基の下に最多10尾が観察され、重なったブロックとブロックの間およびブロック側部のすき間には少なかった。また沖側のものより岸側のブロック下部に特に多数集していた。ケーソンについてみれば奥行き50cm以上の割れ目では開口部長1m当り6～7尾と非常に多くのエビが観察された。周辺に海藻は少なく石灰藻がみられる程度であった。

図 4 0 前浜岸壁

牛根周辺の海底は大・中根石帯で岩間に間隙は多く底質は砂である。海藻はタマイタダキが優占するが水深 1.5 m 付近ではヒラクサもかなりみられる。イセエビは大岩間の割れ目・横穴で観察されたが 2 名 20 分の調査中 7 個体しか発見できず、一ノ首・前浜岸壁に比べ著しく少なかった。

成エビのすみ場所について大島³⁹⁾は岩礁の棚や巨岩・転石下部の間隙で、間隙の高さはエビ体を僅かに余す程であり、適当な奥行きと逃げ道を持つとし、また伊豆諸島における過去の調査では、巨岩下の空洞で 2 カ所以上の入口があり、奥が広がり、空洞内部に小さな棚や穴・転石の間隙などを有する場所に集していたとされている。今回の調査においてエビが多数観察できた場所は一ノ首と前浜岸壁で、地形的には 2 つのパターンに分けられ、1 つは切り立った崖あるいはケーソンの深い割れ目であり、もう 1 つは被覆ブロック下部である。被覆ブロック下部を天然地形にあてはめてみれば、前述した伊豆諸島におけるイセエビすみ場所のように言い換えることができよう。成エビの多く観察された 2 地点の周辺地形をみると、一ノ首は切り立った崖で水深 3.0 m 付近の平坦部を除けば割れ目以外にエビのすみ場所はなく、また前浜岸壁は禁漁区となっておりエビが非常に多く周囲の岩礁は比較的単調である。従って両地点においては周辺に好適なすみ場所も少なく、かつイセエビ個体数が多かったため割れ目やブロック下部に集まったとも言える。しかし過去の調査例からみても、前述した 2 つの地形に昼間イセエビが身をひそめることは明らかで、これらの場所がイセエビのすみ場として重要な意味を持つものと思われる。

e 移 動

(方 法)

昭和56年9月から58年9月にかけて神津島周辺6地点、禁漁区(白根～前浜)・三浦湾・祇苗島・牛鼻・岡作根・赤崎で成エビおよび若令エビ849尾の標識放流を行った(表38・図41)。

放流個体は全て白根から前浜にかけての禁漁区で刺網により捕獲した。放流個体の大きさは表38に示すとおりで、56年11月12～14日放流群は若令エビ、その他の放流群は成エビが主体となっている。標識にはパノック式アンカータグを用い頭胸甲と腹部の間に装着し、放流は船上から行った。なお56年の放流は神津島水産研修会との共同で行った。

図 4 1 標識放流地点

表 3 8 標 識 放 流 結 果

放流年・月・日	標 識	放 流 場 所	放 流 数 (尾)		頭 胸 甲 長 範 囲 (cm)		平 均 甲 長 (cm)	
			♂	♀	♂	♀	♂	♀
56・9・30	黄・1ンク番号	祭漁区・白根	45	23	4.42～10.00	4.69～7.50	7.22	6.47
9・30	白・"	三浦湾・ナガンネ	53	16	4.70～10.58	5.15～7.51	6.89	6.63
10・13	白・刻印番号	祭 漁 区	45	35	4.76～10.38	5.99～7.82	7.34	6.83
11・12～14	白・"	"	92	19	3.72～5.52	3.80～5.12	4.66	4.66
57・5・25	白・1ンク番号	祭漁区・白根	35	28	4.63～9.22	5.03～7.99	5.89	6.77
5・25	青・"	岡 作 根	68	10	4.26～9.48	5.27～8.55	5.73	7.11
9・18	赤・"	牛 鼻	106	92	5.96～9.78	5.19～7.77	7.03	6.86
58・9・7	白・"	赤 崎	102	20	5.08～9.61	5.65～8.02	6.94	6.84
9・7	黄・"	祇 苗 島	49	11	5.43～8.34	6.32～7.92	6.93	6.98

(結果および考察)

昭和58年12月までに再捕された標識エビは表39のとおり合計68尾である。56年9月30日禁漁区白根放流群は56年11月に禁漁区内で2尾, 57年11月に600m離れたサブ崎で1尾再捕され放流点からの移動は少なかった。56年9月30日三浦湾放流群は同地点で1尾が再捕されたに留った。

56年10月13日~11月14日禁漁区放流群は57年5月に1尾, 9月に4尾, 58年9月に1尾いずれも禁漁区内で再捕され移動量は少なかった。56年放流群の再捕率はかなり低いものであるがこれは56年度漁期中標識エビの再捕報告体制が整っていなかったことが最大の原因と思われる。

57年5月25日禁漁区白根放流群は同年9月に前浜岸壁で3尾, 11月に0.7km離れた牛根で1尾, 58年11月に1.1km離れたメイシで1尾再捕された。57年5月25日岡作根放流群は57年11月~58年1月に9尾, 58年12月に1尾再捕され, このうち7尾は放流点から1km以内で再捕され, 1尾は放流点から1.5km地点で, 1尾は海峡を越え1.5km離れた祇苗島で, さらに1尾は177日後に8.5km離れたサイマで捕獲された(表40, 図42)。

57年9月18日牛鼻放流群は58年12月までに26尾再捕され, このうち21尾は放流点から1.5km以内で, 1尾は4km離れた赤崎で, 2尾は4.5km離れた大立で, 1尾は58日後に9km離れたサイマで捕獲されている。サイマで捕獲された個体は今回の再捕例中最も遠方への移動で, かつ経過時間が短かく, 日平均移動量は155mに達した(図43)。

表39 標識放流イセエビ再捕結果

放流年・月・日	放流場所	放流尾数	再捕尾数	再捕率(%)
56・9・30	禁漁区白根	68	3	4.4
9・30	三浦湾	69	1	1.4
10・13~11・14	禁漁区	191	6	3.1
57・5・25	禁漁区白根	63	5	7.9
5・25	岡作根	78	10	12.8
9・18	牛鼻	198	26	13.1
58・9・7	赤崎	122	10	8.2
9・7	祇苗島	60	4	6.7
	不明		3	
計		849	68	

表 4 0 標識放流イセエビ再捕結果

放流年・月・日	放流場所	再捕年・月・日	再捕尾数	再捕場所	経過日数	移動距離(km)
56・9・30	禁漁区白根	56・11・2	2	禁漁区	33	0.8
56・9・30	三浦湾	57・11・14	1	サブ崎	410	0.6
56・10・13	禁漁区	56・11・20	1	三浦湾	51	0.4以下
~11・14		57・5・25	1	禁漁区	224	0.7以下
56・9・30	禁漁区	9・18	4	〃	—	〃
~11・14		56・11・21	1	サブ崎	—	0.6
57・5・25	禁漁区・白根	57・9・18	3	禁漁区・岸壁	116	0.7
		11・18	1	牛根	177	0.7
		58・11・2	1	メイシ	525	1.0
57・5・25	岡作根	57・11・12	1	白島	171	0.7
		11・14	1	白島	173	0.7
		11・14	1	長根	173	1.5
		11・15	1	サイマ	174	8.5
		11・19	1	岡作根	178	0
		11・19	1	赤崎	178	5.0
		11・21	1	岡作根	180	0
		12・21	1	作根	210	0.2
		58・1・22	1	作根	242	0.2
		12・9	1	祇苗島	563	1.7

58年赤崎放流群は10尾再捕され9尾は放流点から0.4 km以内で、1尾は1.9 km地点で再捕された。祇苗島放流群は4尾再捕され、1尾は58日後に9 km離れたショクドウで、2尾は2.1 km地点で捕獲された(残り1尾の捕獲場所不明)。

再捕数の多かった岡作根・牛鼻各放流群についてみれば、再捕地点は島の西側と南側に及び、最短距離を移動したとすれば移動に方向性はみられない。またこれに赤崎放流群を加えた再捕個体のうち、再捕場所のわかっている41尾中35尾85.4%は放流点から1.5 km以内で再捕され、6尾14.6%がそれ以遠へ移動しており、全般的には放流点付近に留るものの遠距離移動を行う個体のあることがわかる。一方祇苗島放流群は再捕尾数4尾と少ないが、再捕場所の判明した3尾の移動距離は2.1~9.0 kmと長くなっている。

57年5月には島西側の禁漁区白根と、東側の岡作根で放流を行い、両者の移動距離を比較すると、岡作根放流群では1 km以上が4尾であるのに対し、禁漁区放流群は0尾であった。

表41 57年9月18日牛鼻放流群の再捕結果

再捕年・月・日	再捕尾数	再捕場所	経過日数	移動距離(km)
57・11・9	2	大立	52	4.5
11・10	1	成沢	53	1.5
11・11	1	白島	54	1.0
11・11	1	ハシルマ	54	0.5
11・11	1	—	54	
11・12	1	ハシルマ	55	0.5
11・13	1	赤土	56	0.2
11・14	4	牛鼻	57	0
11・15	1	サイマ	58	9.0
11・19	1	オカンノン	62	0.5
11・21	1	ハシルマ	64	0.5
11・22	2	オカンノン	65	0.5
12・12	1	白島	85	1.0
12・14	1	ハシルマ	87	0.5
12・15	3	牛鼻	88	0
12・20	1	オカンノン	93	0.5
12・21	1	赤土	94	0.2
58・1・19	1	オカンノン	123	0.5
11・3	1	赤崎	410	3.9

図 4 2 岡作根放流群の再捕地点（放流点付近で2尾再捕）

図 4 3 牛鼻放流群の再捕地点（放流点付近で7尾再捕）

表42 59年9月7日赤崎・祇苗放流群の再捕結果

放流場所	再捕年・月・日	再捕尾数	再捕場所	経過日数	移動距離(km)
赤・崎	58・11・2	2	黒根	56	0.4
	11・3	6	赤崎	57	0
	11・3	1	名組	57	0.3
	11・29	1	オオヤセ	83	1.9
祇苗島	58・11・4	1	シヨクドウ	58	9.0
	11・6	1		60	
	12・2	1	白島	86	2.1
	12・30	1	白島	114	2.1

図44 赤崎・祇苗島放流群の再捕地点
(赤崎放流点で7尾再捕)

この他の放流群についてみても全般的に移動は東から西へ起っており、西から東への移動は少ない。この原因のひとつとして放流エビを全て禁漁区（島の西側）で捕獲していることがあげられ、東側に運ばれた個体が環境の変化を感じて移動傾向が強くなることも考えられる。

高木⁴⁰⁾は千葉県小湊からの標識放流による最遠到達地が29 km離れた千倉であり（放流後24日）、また小湊湾外からは79尾15.1%が再捕されたことを報じている。また静岡水試⁴¹⁾による最遠移動記録は御前崎から福田港まで34 kmを523日間に移動したものである。

今回の調査による最遠到達記録は58日間で9 kmというもので、千葉・静岡の例より短い。神津島の周囲は約22 kmで、1 km以上の移動は確認しよがなかった。個体群として移動距離をみると、1.5 kmを越えて移動するものの割合（14.6%）は高木による小湊湾外へ移動した個体の割合（15.1%）とよく一致している。

次に移動経路の地形をみると、放流点と再捕地点の間に砂地をはさむ場合があり、例えば、岡作根・牛鼻と赤崎・大立の間には返浜、サイマとの間には多幸湾がある。特に多幸湾の砂地は2 kmも続き、通常岩礁に生息する成エビが長い砂地を越えて移動する事実は注目される。

一方、神津島の東には祇苗島があり、本島間とは深さ50～60 m、最短距離800 m、底質礫の海峡によって隔てられている。58年9月祇苗島放流群のうち3尾はこの海峡を越え本島側へ移動し、また57年5月岡作根放流群の1尾は563日後に祇苗島で再捕され、海峡を越える両方向の移動が確認された。

f 頭胸甲長組成

（方法）

昭和57年11・12月および58年11月、神津島において漁獲されたイセエビの性別および甲長を測定した。11月は7カ月間の禁漁後最初の漁獲である。測定期間は各月漁期間の初めに当る。神津島を下記6地区に区切り、各区ごとに集計を行った。本島4地区の境界は砂浜である。(1)返浜～沢尻湾、(2)前浜～多幸湾、(3)多幸湾～返浜、(4)恩馳島、(5)祇苗島、(6)沢尻湾～前浜（禁漁区）。なお57・58年は禁漁区の解放はされなかったため(6)からの漁獲はない。

（結果および考察）

各地区ごとの雌雄別甲長組成を図45～49に、測定数を表43に示した。

(1) 返浜～沢尻地区（図45）

♂：57年11月の測定数は少ないが、5.8～7.0 cmの個体の比率が高く、12月は

7.2～8.4 cmの個体が減少，4.4 cm未満が増加しやや小型化した。58年11月は4.7 cm付近に峯のある点で57年12月と似ているが，6.0 cmから急激な増加が起っており，57年より大型化している。

♀：57年12月の組成は鋸歯状で峯は明瞭でないが，58年11月には4.3 cmと6.1 cm付近に峯がみられる。

図4.5 返浜～沢尻湾地区イセエビ頭胸甲長組成

(2) 前浜～多幸地区 (図4.6)

♂：各組成にはいずれも4.7 cmと6.2 cm付近に峯がみられる。58年11月には7～8 cmの個体が増加している。

♀：各組成の峯の位置にはくい違いが多く共通した傾向がみられない。

(3) 多幸～返浜地区 (図4.7)

♂：57年11月には6.0 cmと6.6 cm付近に峯がみられ，12月には7.6 cm以上の個体が増加し大型化しているが，峯は不明瞭である。

♀：57年11月は6.7 cm付近に峯があり，組成は鋸歯状を呈する。12月は6.4～6.6 cmに最も高い峯があるが，7.2 cm以上の比率が増加し全体として大型化した。

(4) 恩馳島 (図4.8)

♂：57年11月には4.3・5.3・6.1・7.0・7.5 cm付近に峯がみられる。12月に

図4 6 前浜～多幸湾地区イセエビ頭胸甲長組成

図4 7 多幸湾～返浜地区イセエビ頭胸甲長組成

は峯がやや右にずれ、7.5 cm付近の峯は消え、5.8 cm未満の小型群が増えている。58年11月には4.5 cmに小さい峯があり、5 cm以上では6.3 cm付近に峯を持つ一つの大きな山になっている。

♀：57年11月は4.4～6.6 cm、12月には4.4～7.0 cmの個体の比率が高い。雄に比べてどちらの月も小さいが、特に11月は差が大きい。58年11月は57年11月に似た組成を示すが、7.6 cm以上の個体が増加している。

図48 恩馳島イセエビ頭胸甲長組成

表43 イセエビ甲長の地先別測定尾数

(尾)

測定日	性	返浜～沢尻	前浜～多幸	多幸～返浜	恩馳島	祇苗島
57・11・10～14	♂	93	611	510	441	78
	♀	40	261	218	147	33
57・12・8～11	♂	427	517	208	599	31
	♀	232	337	168	299	24
58・11・2～4	♂	820	1080	103	954	185
	♀	408	585	35	359	61

(5) 祇苗島 (図 4 9)

♂ : 測定数はいずれも少ないが, 58年11月は5.4~6.9, 6.9~8.0, 8.0~8.9 cmに山がみられ, 9 cm以上の個体もかなり多い。

図 4 9 祇苗島イセエビ頭胸甲長

地先別の組成を比較すると, 57年11月の雄では返浜~沢尻地区と祇苗島でやや大型個体が多く, 前浜~多幸地区と多幸~返浜地区はいずれも6 cm付近に峯があり比較的似かよった組成を持っている。恩馳島にも6 cm付近に峯があるが, 5.3, 7.0, 7.5 cmにも明瞭な峯がみられ, 全体的に山は広がっている。

11月の雌のうち, 測定数の多い3地区を比べると多幸~返浜地区は大型, 恩馳島は小型, 前浜~多幸地区は両者の中間であるがその差は大きいものではない。

57年12月の雄の組成をみると, 恩馳では各峯が11月より左にずれ小型化し, 多幸~返浜で7.2 cm以上の大型個体の比率が増していることがわかる。また特に若令群の多い地区は認められない。雌についてみても雄と同様恩馳島で小型個体が多く, 多幸~返浜地区に大型個体の比率が高い。また祇苗島は測定数が少ないが雌雄とも最も大型個体の比率が高い。

58年11月についてみると, 雌雄とも恩馳で小型, 祇苗で大型, 本島の3地区は両者の中間でほぼ同じ大きさであった。前年11月と比較すると返浜~沢尻地区の雌雄と恩馳の雄を除き甲長の増大が認められ, 神津島全体としてみれば組成は若干大型化していると言える。

漁業者からの聞き取りによれば, 深場で採れるエビは概して大きく, これを専門的にねらう船があるという。この船がどの地先で操業したかによって甲長組成に影響が出る可能性は残るが, 得られた資料から各地先甲長組成を全体的に比較すると, 恩馳島では小型, 祇苗島で大型, 神津島本島はその中間である。また若令群が特に多く出現する地先はみられず, 幼生の着定は島全体に起っているものと思われる。

野中³³⁾ によって記載された近景4地先(小湊・真鶴・石廊崎・大瀬)および八丈島⁷⁾

の甲長組成と比較すると、神津島の組成は近県より大きく、八丈島より小さくなっている。

各組成をみると甲長4～5 cmに峯を持つものが多く、この峯が定着後1年を経過したI令群であることは間違いのないものと思われるが、甲長5 cm以上では峯の位置に明瞭な一致がなく、年級分離は困難と考えられる。

g 甲長と体重の関係

(方法)

57年5月25日および9月18日禁漁区前浜岸壁周辺で成エビを捕獲し、頭胸甲長と体重を測定した。

(結果)

5月25日には雄115尾(甲長4.43～10.26 cm, 平均5.99 cm), 雌39尾(4.93～8.55 cm, 平均6.83 cm), 9月18日は雄217尾(3.80～10.12 cm, 平均6.32 cm), 雌118尾(3.86～7.77 cm, 平均6.61 cm)を測定した。5月の雌は全て抱卵しており、9月の雌は全て未抱卵であった。頭胸甲長と体重の関係を $W = aL^b$ 式に当てはめた結果下式を得た。

$$\begin{array}{lll} 57年5月25日 \quad \delta & W = 1.396 L^{2.737} & W: \text{体重 (g)} \\ & \text{♀ (抱卵)} W = 1.504 L^{2.788} & L: \text{頭胸甲長 (cm)} \\ 9月18日 \quad \delta & W = 1.206 L^{2.836} & \\ & \text{♀ (未抱卵)} W = 1.547 L^{2.722} & \end{array}$$

これらの式から甲長0.5 cmごとの体重を求め表44に示した。

表 4 4 イセエビ計算体重

頭胸甲長 (cm)	5 月 2 5 日 体 重 (g)		9 月 1 8 日 体 重 (g)	
	♂	♀ (抱 卵)	♂	♀ (未 抱 卵)
3.0	2 8.3	3 2.2	2 7.2	3 0.8
3.5	4 3.1	4 9.4	4 2.1	4 6.9
4.0	6 2.1	7 1.7	6 1.5	6 7.4
4.5	8 5.7	9 9.6	8 5.9	9 2.9
5.0	1 1 4.4	1 3 3.6	1 1 5.7	1 2 3.7
5.5	1 4 8.5	1 7 4.3	1 5 1.7	1 6 0.4
6.0	1 8 8.4	2 2 2.2	1 9 4.1	2 0 3.2
6.5	2 3 4.6	2 7 7.7	2 4 3.6	2 5 2.7
7.0	2 8 7.3	3 4 1.5	3 0 0.5	3 0 9.2
7.5	3 4 7.1	4 1 3.9	3 6 5.5	3 7 3.1
8.0	4 1 4.1	4 9 5.5	4 3 8.9	4 4 4.7
8.5	4 8 8.9	5 8 6.7	5 2 1.2	5 2 4.5
9.0	5 7 1.7	6 8 8.1	6 1 2.9	6 1 2.8
9.5	6 6 2.9	8 0 0.0	7 1 4.5	7 1 0.0
1 0.0	7 6 2.8	9 2 3.0	8 2 6.4	8 1 6.4

h 性 比

(方 法)

5 7 年 1 1 月・1 2 月および 5 8 年 1 1 月, 神津島において漁獲エビの性別と頭胸甲長を測定し (f 頭胸甲長組成参照) 得られた資料から甲長範囲別性比を求めた。

(結果および考察)

測定数の多い地先について甲長範囲 1 cm ごとの性比を図 5 0・5 1 に示した。性比はほとんど 1 以上で雄の数が雌を上回っている。5 7 年の甲長別性比をみると, 各地先共通の規則性を持って変化していることがわかる。すなわち甲長 4 cm 以上で甲長増加と共に性比が増大し, 7 ~ 8 cm 区画で一時的減少が起り, 8 cm 以上で再び急激に上昇する。1 2 月の恩馳ではこの変化が 1 cm 小さい方にずれ性比の一時的減少が 6 ~ 7 cm 区画にみられる。また例外的に 1 1 月の恩馳においては性比の一時的減少が起らず一貫した増加が認められる。

58年にも恩馳を除き性比の一時的減少がみられるが、減少区画は57年より小さく5～6cmで起っており、また減少幅は57年に比べ小さい。

甲長別性比に対しては、羅網率・死亡率・生長速度等の雌雄差が影響を与えられ、上記のような変化の原因は明確でない。

甲長4cm以下の性比は地先による差が大きいが、これは漁獲尾数が少ないことによる標本抽出誤差と思われる。また57年11月と12月の性比を比べると、前浜～多幸湾地区と多幸湾～返浜地区で12月の値が全体的に下がっていることがわかる。

図50 57年頭胸甲長別性比 (○: 57年11月, △: 57年12月)
性比: ♂/♀

图 5 1 頭胸甲長別性比 58年11月
性比：♂/♀

i 資 源

(方 法)

イセエビ漁獲量および出漁日数を各種統計資料から集計するとともに、神津島イセエビ漁業者から過去の操業形態について聞き取り調査を行った。利用した統計資料は、「東京都の水産」、「関東農政局大島統計情報出張所資料」、「神津島漁協決算報告書」、「神津島漁協水揚台帳および伝票」である。

(結果および考察)

利島から神津島海域における昭和24年以降のイセエビ水揚量は図52に示すとおりで、最高は昭和24年の52.3t、最低は37年の3.9tである。漁獲量の年変動はかなり激しく、漁獲のピークは24年、26年、28年、33年、40年、46年にみられ、漁獲の落ち込みは25年、27年、31年、37年、42年、52年にみられた。全般的な傾向をみると、24年から37年にかけては減少、38年から46年にかけては増加、47年から52年まで減少し、その後やや増加している。

利島～神津島海域中神津島地区における漁獲量が最も多く、最近10年間では全漁獲量の41～46%を占め、またこの地区の漁獲量変動は全漁獲量変動傾向と一致する(図52)。このため以下神津島地区について述べることにする。

図52 イセエビ漁獲量と水温年平均較差の年変動

漁獲量変動を引起す要因には多くのものが考えられ、種々の要素が複合して漁獲量に反映される。昭和24年以降のイセエビ漁業についてみると、人為要因（漁獲努力量・漁具効率）にいくつかの変化が認められる。

第1は35年頃に起った刺網素材の変化（綿糸から合繊）である。綿から合繊に変わったことにより網の強度が増し維持・補修が省力化された。

第2は同じく35年頃に起った木製浮子から合成浮子への変化である。木製浮子は水を吸うと浮力を失うため時々乾燥させる必要があり、合成浮子の使用によって乾燥時間を省略し、長時間の連続使用が可能になった。

第3は37年頃から普及しはじめたウェットスーツの使用である。神津島における操業方法は、まず水面を泳ぎながら海底地形に合わせて岩の脇に網を落とし、次に素潜りで沈下した網の乱れを整えるというものである。揚網時にも水面を泳いで海中の網なりを見ながら網をたぐり、随時素潜り潜水し岩にかかった網を外していく。船上からの投げ込み漁法も行われるが、主体は潜りがけである。従って水温の低下する冬期には裸潜りでは掛けられる反数が限られるが、ウェットスーツの出現はこの障害を大幅に取除いた。

第4は置き網日数の増加である。昭和40年代までは日中～夕方に投網し翌朝揚網するという1晩どりが行われていたが、50年頃から投網後2～3晩置きっぱなしにする操業形態が普及し、これにより常時多数の網が海中に置かれ漁獲強度が強まった。

第5は漁場の拡大である。前述した潜り掛け漁法のため、漁場水深は15m以浅が主体であったが、50年頃から放り込み漁法（船上から網を投げ込むだけで潜水はしない）によって15m以深の漁場が開発された。

第6は船の動力化・馬力アップによる操業の効率化である。

第7は以上の要因によってもたらされる使用反数の増加である。20年代前半には、1人当たり5～10反（1反15間）程度を使用するに過ぎなかったが、現在では、1人当たり30反（1反20間）もの網を使用している。

一方自然要因についてみれば、新島・神津島における11・12月水温の平年較差は、28～39年には漁獲量変化と相関がみられるものの、40年以降は全く相関がない。

また黒潮流軸は二谷^{A-13}の分類によるA型が34～37年、50～55年に起っており、この時期に含まれる37年と53年に漁獲の減少がみられる。しかし、同じくA型海況に含まれる50・51・55年には高い漁獲をあげており、黒潮流軸と漁獲との関係は顕著でない。

この他の自然要因も漁獲変動を十分説明できるものではなく、恐らく自然要因による資源変

動よりも漁獲強度の変化とそれに伴う資源量変動の方が強く、漁獲量には人為要因が強く反映されるものと思われる。

漁獲量変動を人為要因から説明すると下記のようなものである。昭和24～29年は資源量の豊富な時期で、初歩的漁具によっても高い漁獲をあげることができた。33～37年は漁獲による資源減少で漁獲量が減少する時期である。38～47年は網の合繊化・浮子の合成ゴム化・ウェットスーツの普及などにより漁獲強度が強まり、漁獲量が増加する。47年以降漁獲によりさらに資源が減少し、漁獲量も低下傾向にあるが、置き網日数の増加と漁場の拡大により49～51年には漁獲が持ち直している。

漁獲量変動を全て漁獲強度変化とそれに伴う資源量変化から説明することには無理があるが全般的にみれば昭和24年以降漁獲による資源減少を漁獲強度の増加と漁場拡大によって補って来たものと考えることができよう。

昭和20年代後半と、最近の漁獲努力量を比べると、20年代後半には1人10反、1反当たり15間、合計150間、最近では1人30反、1反当たり20間、合計600間である。これに昭和27・28年の平均出漁日数1,803日と56・57年の1,296日に乗じて比較すると、20年代後半に比べ最近の漁獲強度はおおむね2.9倍に上昇しているものと考えられる。

C P U Eは下記のように求められる。

	昭和27・28年	昭和56・57年
使用反数(1人当たり)	10反×15間=150間	30反×20間=600間
出漁日数	平均1,803日	平均1,296日
1隻当り人数	3名	3名
漁獲量	9,776 kg	14,868 kg
C P U E(1日20間当り)	0.241 kg	0.127 kg

C P U Eは20年代後半に比べ最近は半減している。

次に漁獲の全く行われていない漁場における資源量を推定する。昭和55年2月に禁漁区の開放が4日間行われた。この時は1人エビ網3反に制限され、漁獲努力量が正確に把握できる。毎日の漁獲量とC P U EからDe Luryの方法を用いて資源量を推定し(図53)3.16 tという値を得た。ちなみに禁漁区は27 haである。禁漁区は55年以前は3年以上口止めされており、この値は当該地区の最大資源量と考えられる。

図 5 3 神津島禁漁区のイセエビ資源量

j 害敵生物

(方法)

定着したブエルス・稚エビの害敵生物を明らかにするため、イセエビ刺網に羅網した魚の消化管内容物を大島・神津島で調査した。調査種は22種・114個体である。(表45)。

(結果および考察)

ホウライヒメジは27個体調査し(叉長29.0~37.5cm),このうち9月6日大島で捕獲した叉長34.7cmの個体から第Ⅲ期稚エビ1尾(甲長11.2mm),10月5日大島で捕獲した叉長32.0cmの個体からブエルス1尾を発見した。この魚の消化管からはイセエビの他カニ類,シャコ・セミエビ類・エビ(遊泳類)・魚類・腹足類・多毛類・海藻片などが出現し,甲殻類なかでもカニ類が最も多量にみられた。このような消化管内容物からみて,ホウライヒメジが稚イセエビを選択的に捕食しているとは考えられず,恐らく夜,岩間・葉間から出た稚エビ・ブエルスがたまたまこの魚と遭遇した時捕食されるものと思われる。

しかしホウライヒメジは神津島地区では普通にみられ(単独もしくは小群を成して海底付近を遊泳している),消化管内容物量も今回調査した魚種中最大であることなどから,稚エビに対する主要な害敵生物の1つになっているものと考えられる。

調査したこの他の魚の消化管からはイセエビは発見されなかったが,甲幅・甲長5mm以上の甲殻類を捕食している魚種は,タカノハダイ・イシガキダイ・カワハギ・イラ・ウツボ・ウチワザメである。

このうちタカノハダイ(叉長24.0~37.8cm)は概して小型甲殻類を捕食し,甲幅1cm

表 4 5 消化管内容物調査魚種数

種	大 島	神 津 島	計
ホウライヒメジ	23	4	27
ダカノハダイ	32	2	34
イシガキダイ	16	1	17
カワハギ	13	0	13
ブダイ	3	1	4
ニザダイ	3	0	3
その他 16 種 *	9	7	16
計	99	15	114

*その他の魚種名(全て1個体)

キンチャクダイ・ハコフグ・ミギマキ・ハリセンボン・ウマズラハギ・
 ミナミイヌズミ・ウミスズメ・シマテングハギモドキ・ホウキベラ・テ
 シクイサキ・オキナメジナ・ウチワザメ・メジナ・インダイ・イラ・
 ウツボ

を越えるカニは消化管中に出現していないことから、イセエビに対する捕食は少ないものと思われる。

イシガキダイは調査した小型標本(叉長15.8~28.2cm)についてみればカイメンが主体で甲殻類は少なかったため、この程度の大きさのイシガキダイがイセエビを捕食することは少ないと思われる。

カワハギ(叉長19.0~28.5cm)消化管には貝類・甲殻類・海藻片などがみられ、甲殻類としてはカニ・ヨコエビ・ヘラムシ・ワレカラなどが含まれていた。しかし、これら甲殻類はいずれも小型で、最大のものでも甲幅8.5mmのカニであった。これらのことからカワハギによるイセエビの食害は少ないと思われる。

イラ・ウツボ・ウチワザメは調査標本が少ないため明確なことは言えないが、3種ともかなり大きなカニが胃から出現しイセエビを捕食する可能性は十分残されている。またウツボについてみれば、漁獲したウツボ消化管からイセエビが現われることがあると言われる(漁業者から聞き取り)。潜水観察によれば、オハグロベラが小エビ(遊泳類)を捕食しており、ベラ類が稚イセエビを捕食することも考えられる。

この他イセエビ類を捕食する可能性の強い種を既往知見から拾うと、ハタ類・カサゴ類・ゴンスイ・イセエビ・タコなどがあげられる。

k 食 性

(方 法)

神津島牛鼻でヒラクサ中から採取した第Ⅰ期稚エビ14尾、および神津島禁漁区から採捕した成エビ10尾の胃内容物を調査した。

(結果および考察)

調査した標本のうち第Ⅰ期稚エビ10尾と成エビ7尾は空胃であった。残る標本についてみると第Ⅰ期稚エビは主として貝類・甲殻類を摂餌し、この他コケムシ・有孔虫等もみられた。成エビでは甲殻類・微小貝が出現した(表46)。

イセエビの胃内容物を過去の調査例にみれば(5, 29, 42)稚エビについては巻貝が主体でこの他二枚貝・カニ・ヨコエビ・ウニ等がみられ、成エビでは貝殻片・カニ類が多くこの他エビ・フジツボ・環形動物・ウニ・ヨコエビ等多種が出現している。神津島における稚エビの胃内容物も既往結果とほぼ一致し、巻貝類・甲殻類が主餌科になっているものと思われる。

表46 イセエビ胃内容物

	巻 貝	二 枚 貝	甲 殻 類	コケムシ	有 孔 虫	海 藻 片	備 考
稚エビ	1 体 分			+	+	+	石灰質・キチン質片多
	4体分以上	1体分以上	+	+			
	C 4体分以上		+				
成エビ			+				
	微小貝2		大型ガニ				

2 造成漁場の生物相

a 岩礁帯

(方法)

昭和57年5月24・25日および8月12日神津島成沢からテゴナミにかけての岩礁帯で動植物相調査を行った(表47)。調査位置は図54に示す5カ所で、各地先岸寄りの水深10m付近から沖に向かって200mロープを張り、ロープに沿って沖から岸へ潜水観察・採集を行った。海藻については、おおよそ水深5mおきの1㎡採取りと目視観察を行い、動物については目視観察と一部1㎡採取調査を実施した。生物調査とあわせて海底地形を概観するとともに所々鉄棒を差し込んで砂層の厚さを測定した。

表47 ライン調査日

調査日	調査場所
57・5・24	牛鼻
5・25	テゴナミ・運上根
8・12	ハシルマ・成沢

図54 動・植物相ライン調査地点

(結果)

1) テゴナミ沖出し線

(1) 海底地形

水深は図55に示すとおりで沖出し200mでも水深15mと比較的遠浅で、一般的に根石が多い。沖出し0~60mと200m付近でやや砂地は多くなるが、概して砂層は薄く、多くは20cm以下、厚い部分でも50cm位であった。60~180mでは大・中根石が多くそれらの重なりもみられた。

図55 テゴナミ線海底勾配

(2) 植物相

各点1㎡採取結果を表48に示した。

沖出し100m点(水深8m)でヒラクサは採取地点には着生しないが、根石下部(水深9m)には所々みられる。トサカノリは場所により着生量にかなり差があり、採取地点は多い方である。

150m点(水深10m)ではヒラクサがやや増加し、石灰藻・キントキ・タマイタダキが目立つ。ヒラクサは大石下部の岩と岩の間隙に着生する傾向がみられる。

200m点(水深15m)ではヒラクサが優占するが、その量は運上根・牛鼻出し線に比べ少なく、草丈も短い。

(3) 動物相

魚類ではスズメダイ・コバルトスズメ・タカノハダイ・キンギョ・ハナダイ・ブダイ・タカベ・ヒメジ等が多く、この他約10種が観察された。定着性動物としてはヤギ類トゲトサカ類が多く、この地域の潮流が速いことを示しており、沖出し140~160m付近ではこれらの動物が大岩側面を密に覆いイソギンチャク・クマノミ・キンギョ・ハナダイなどとともにより熱帯の景観を呈している。

2) 運上根沖出し線

表4 8 テゴナミ線植物相 (1 m²内湿重量 g)

沖 出 し	1 0 0 m	1 5 0 m	2 0 0 m
水 深	8 m	1 0 m	1 5 m
ヒ ラ ク サ		5 4 0 (2 4.8) *	1, 2 7 5 (3 0.6) *
キ ン ト キ		5 5	4 0
ト サ カ ノ リ	8 5 0		
石 灰 藻		9 0	
そ の 他	8 8	1 1 0	5 2
計	9 3 8	7 9 5	1, 3 6 7

* 平均草丈 (cm)

(1) 海底地形

水深を図5 6 に示す。このラインは8 0 m地点 (水深1 0 m) を境に岸側は単調な岩盤帯, 沖側は岩の重なりのある根石転石帯となり好対象を成す。岸側の岩盤帯では所々に大石・中小転石・砂地がみられ, 砂層は4 0 cm以下である。沖側は大石・中小根石・転石が重なり砂地も散見されるが砂層は5 0 cm以下であった。

図5 6 連上根線海底勾配

(2) 植物相

水深1 0 m以浅ではヒラクサはほとんどみられず, 石灰藻・タマイタダキ・シマオウギ等が優占する。水深1 0 ~ 1 5 mでは岩と岩の間の谷の部分にヒラクサがみられるものの岩上には少ない。1 5 m以深はヒラクサ帯となる。

(3) 動物相

表 4 9 運上根線植物相 (1 m²内湿重量 g)

沖出し	0 m	3 5 m	9 0 m	1 7 0 m	2 0 0 m
水深	8. 5 m	1 0 m	1 0 m	1 4 m	1 8 m
種					
ヒラクサ				2,595 (39.5)*	1,770 (32.9)*
石灰藻	80		360	45	
タマイタダキ	20	145	40		+
シマオウギ		55	55		
その他	25	50	7	10	
計	125	250	462	2,650	1,770

* 平均草丈 (cm)

沖出し 8 0 m 以浅の岩盤帯には動物が少なく、アメフラシ・ウツボ・アカハタ等少数がみられるに過ぎない。8 0 m 以遠ではイスズミ群・ブダイ・ヒメジ・タカノハダイ等魚類が豊富にみられた。また採集したヒラクサからヘラムシ・ツノコケムシ・ワレカラ等多数の小型動物が発見された (2 - d 参照)

3) 牛鼻沖出し線

(1) 海底地形

沖出し 0 ~ 1 0 0 m は大型の転石帯で、所々に砂層 3 0 cm 以下の砂地がみられる。1 0 0 ~ 2 0 0 m では中根石 (径 1 ~ 2 m) ・転石帯で砂地は少ない。2 2 0 m 地点から沖は完全な砂地が広がる。

図 5 7 牛鼻線海底勾配

(2) 植物相

水深 1 0 m 以浅ではヒラクサはほとんどなく、石灰藻を主体にタマイタダキ・ユカリ

がまばらに着生するだけで丈の高い藻を欠く。水深15m以深では杵取り結果(表50)からわかるようにヒラクサが優占する。杵取りでは水深15mで最も着生量が多いが、目視観察によれば15m付近のヒラクサ着生量はそれ以深よりやや少ない。牛鼻線は他の地先に比べ最もヒラクサが多かった。

表50 牛鼻線植物相(1m²内湿重量g)

沖出し	90m	140m	160m	190m
水深	10m	15m	18m	23m
ヒラクサ		2,835 (45.0)*	2,092 (38.3)*	2,159 (39.5)*
石灰藻	255			
その他	82			
計	337	2,835	2,092	2,159

* 平均草丈(cm)

(3) 動物相

水深10~15mの岩間でイセエビ2尾を観察した他、ブダイ・ニザダイ等魚類多数が観察された。

4) ハシルマ沖出し線

(1) 海底地形

沖出し0~200mは大・中根石転石帯で所々小さい砂地がみられる。20~30mは根石・転石主体、40m付近(水深16m)では転石の間に砂地が増えはじめ、60m付近では砂地が転石より多くなる。80m以遠では砂地帯となりまばらに小転石がみられ、砂層は沖出し200m地点でも20~40cmである。

図58 ハシルマ線海底勾配

(2) 植物相

水深15m地点の1㎡採取結果は、ヒラクサ2,025g平均草丈38.4cm, その他35g, 水深10m地点は、石灰藻128g, タマイタダキ84gであった。水深15m以浅についてみると植相は単調で、ヒラクサ・石灰藻・タマイタダキ・キントキが主体であった。

(3) 動物相

岩上および岩下に着生する動物としては、ウラウズガイ・クモヒトデ・クモガニ類がみられたが、いずれも1㎡内に数個体と数は少なかった。

5) 成沢沖出し線

(1) 海底地形

この場所は沖出し200mでも水深13mとかなり遠浅であった。全域が大・中根石転石帯で所々に砂地があり、砂層は最高60cmであった。

図5.9 成沢線海底勾配

(2) 植物相

各採取地点ともヒラクサがみられず、この原因のひとつは水深が全般的に浅いことにあるが、このラインの最深部は13mあり、牛鼻・運上根沖であればヒラクサの着生している水深である。それにもかかわらずこのラインにヒラクサが少ないことは、この藻の着生に水深と基質の存在以外の要因が必要なことを示唆している。

(3) 動物相

主として定着性動物の観察を行い、最も数が多い種はウラウズガイ(1㎡当り0~12個体)でこの他ヤドカリ類・ギンタカハマ・クボガイ等がみられたが生息密度は低い。

b 砂地帯

(方法)

57年7月25日および8月10に観音浦沖10測点(図60)において熊田式採泥器に

表5 1 成沢沖出し線植物相(1 m²湿重量 g)

沖出し	0 m	40 m	110 m	200 m
水深	7 m	8 m	10 m	13 m
種				
石灰藻	240	27	47	25
トサカノリ	46	35	110	+
キントキ	25	80	88	15
タマイタダキ	+		32	24
その他				20
計	311	142	277	84

図6 0 砂採取地点

よって砂を採取し、砂中動物を拾い出した。砂の採取はパンフィック航業(株)が行い、拾い出した動物のうちヨコエビ類の査定は永田樹三博士に、多毛類の査定は東京大学海洋研三浦知之博士にお願いした。

(結果)

各採集測点の水深・砂採取量・粒度組成は表52に示すとおりである。底生生物は貝類が最も多く(61種以上)、ついで多毛類(20種以上)・ヨコエビ類(12種)が多くなっている³²⁾。採集動物はほとんど小型のもので殻長・体長が1cmを越えるものは非常に少なかった。またコケムシ類の大部分と貝類の一部は死殻であった。貝類についてみると出現種は南方系で三宅島・八丈島との共通種が多く、量的にはかなり豊富なため、各種動物の餌となっているものと思われる。

c ヒラクサ着生状況

(方法)

神津島・大島において水深別のヒラクサ採取を行うとともに大島泉津の定点で57年8月～58年10月、毎月1回潜水によりヒラクサの葉長を測定した。

(結果および考察)

水深別ヒラクサ着生量をみると(表53)大島と神津島では差があり、大島では水深10m付近から場所によって着生がかなりみられ、20mで最も多く、25m以深では次第に減じ40mでは着生していない。神津島では10m付近では着生がなく(場所によっては少量着生するところもある)、15m付近から出現しはじめ、30～40mで最も多くなる。それ以深の調査は今回は行っていないが、当场が昭和30年に行った調査では水深73mからヒラクサを採取している⁴³⁾。

草丈は57年5月24日、神津島で採取した74.0cmが最高で、58年に行った各採取調査における平均草丈は32.3～40.2cmの範囲にあった(表54)。

大島泉津の定点で追跡した11株のうち9株は周年着生し、2株は8月の台風によって流出した。葉長は水中測定のため正確なものではないが、秋～冬期短くなる傾向がみられた。特に58年秋には葉数・葉量の顕著な減少が確認された。

ヒラクサは伊豆諸島に着生する海藻中最も葉間の間隙に富み、このためにプエルルスはヒラクサに好んで着定するものと思われる。

表 5 2 各測点粒度組成 (質量百分率 %)

測点	A-1	A-2	A-3	B-1	B-2	B-3	B-4	C-1	C-2	C-3
採取月・日	8・10	8・10	8・10	7・25	7・25	7・25	7・25	7・25	7・25	7・25
水深 (m)	27	25	36	15	28	30	35	23	30	31
採取量 (g)	950	912	1,178	1,012	1,356	662	1,052	1,417	1,243	1,279
" (cc)	700	600	700	800	900	400	700	900	800	900
粒 度 mm	3.17 ~	0	8.0	0	3.5	0	0	0	0	0
	1.59 ~ 3.17	0.9	0	2.1.2	0	1.7	1.2.4	1.2.0	2.1.2	6.0
	7.93 ~ 15.9	0.1	0	2.2.5	0	2.3	1.3.3	2.4.3	2.1.6	1.8.2
	4.00 ~ 7.93	0.7	2.1	1.4.7	0	7.0	1.4.9	1.3.3	1.0.4	3.3.4
	2.00 ~ 4.00	4.4	1.2.8	8.3	0.2	1.6.7	1.4.8	8.0	1.1.3	2.0.6
	1.00 ~ 2.00	1.7.5	5.5.6	7.6	3.2.6	3.5.1	1.4.8	1.1.1	1.4.6	1.2.3
	0.50 ~ 1.00	3.7.8	2.3.7	8.4	5.4.1	2.1.2	1.7.7	1.2.8	9.1	6.4
	0.25 ~ 0.50	2.5.9	4.3	7.8	1.2.1	1.1.0	1.0.9	1.5.8	1.0.5	2.7
	0.125 ~ 0.25	4.4	1.4	1.3	1.0	1.4	1.1	2.7	1.4	0.4
	0.063 ~ 0.125	0.1	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0

表53 ヒラクスサ水深別着生量 58年 (kg/m²)

採取場所	採取日	水深 (m)							
		5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
大島・泉津・二本松 岡田・小口	5・28	0	0.43	0.57	0.83				
	7・1	0	0.98	0.75*					
泉津・鉄砲湯 差木地・河の沢	7・29, 8・12	0	0	0.27	1.22	0.84	0.32	0.06	0
	10・31	0	0	0.39	0.59				
大島平均		0	0.57		0.88				
神津島・牛鼻 ・サイマ	8・4	0		0.81	1.51				
	9・8, 10・4	0	0		0.10	0.33			0.33

*水深1.3m

表54 ヒラクスサ水深別平均草丈 58年 (cm)

採取場所	採取日	水深 (m)							
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5		
大島・泉津	5・28	平均cm 3.5.2	3.4.5	4.0.2					
		範囲cm 2.4~5.3	2.0~5.4	2.8~5.3					
岡田	7・1	平均 3.9.3	2.8.3						
		範囲 2.8~5.3	2.2~5.4						
泉津	7・29	平均 3.6.8	3.6.8	3.9.2	3.8.9	3.3.3			
	8・12	範囲 2.9~5.2	2.9~5.2	2.6~5.1	2.0~6.1	1.9~4.6			
神津島・牛鼻	8・4	平均 3.2.3	3.2.3	3.4.4					
		範囲 1.7~5.7	1.7~5.7	1.3~5.1					

d ヒラクサ中の動物

(方法)

昭和58年6月9日神津島牛鼻沖の水深15mと20mにおいて1m²内のヒラクサを採集し、ヒラクサ中の動物量を調査した。動物種の査定に当って端脚目数種については元南西海区水研永田樹三博士にお願いした。

(結果および考察)

両水深の動物数は表55に示すとおりで、貝類・甲殻類が多量に出現する。貝類についてみると、水深15mでは総数2,091個体(ヒラクサ1kg当り1,072)、水深20mでは総数3,211個体(ヒラクサ1kg当り1,566)で、なかでもチャツボは水深15mで1,416個(貝類総数の67.7%)、20mで2,856個(貝類総数の88.9%)も出現している。チャツボの殻高組成をみると(図61)0.4~0.6mmにモードがあり、最大でも1.44mmである。この他の巻貝類も大多数は微小貝で、殻高1cmを越える個体はきわめて少なかった。

甲殻類についてみると、端脚目と等脚目が多く、端脚目は水深15mで859個体(甲殻類の69.7%)、水深20mで434個体(74.7%)、等脚目は水深15mで336個体(26.6%)、20mで140個体(24.1%)出現している。なお端脚目中最も多く出現した*Concholestes* sp. は微小巻貝の殻中に寄居する。

この他コケムシ類と有孔虫類が多数みられたが、コケムシ類は群体を形成し、また有孔虫類は微小であるため計数しなかった。

ヒラクサ中に出現する動物と第I期稚エビの胃内容物はほぼ一致し、ヒラクサが稚エビの餌場の役割も果していることがわかる。

図61 チャツボ殻高組成
58年6月9日、神津島水深15m

表 5 5 ヒラクサ中の動物数 (1 m²) 5 8 年 6 月 9 日

門	綱			水深 1 5 m	水深 2 0 m
軟体動物	腹足類	.	チャツボ	1,416	2,856
			ベニバイ	204	81
			サラサバイ	9	9
			チグサガイ	35	22
			マツムシガイ	6	13
	その他巻貝		116	177	
節足動物	甲殻綱	端脚目	Concholestes sp.	328	37
			Cerapus tubularis	73	56
			ワレカラ類	54	32
			その他	424	309
	端脚目計		879	434	
節足動物	甲殻綱	等脚目	ヘラムシ科 sp.	145	64
			コツムシ科 sp.	61	44
			Isopoda sp. 1	55	12
			Isopoda sp. 2	0	19
			その他 Isopod	75	1
			Isopoda 計	336	140
節足動物	十脚目		長尾類	11	0
			短尾類	12	2
			異尾類	0	1
			十脚目計	23	3
節足動物	タイナス目 橈脚類 その他甲殻類			0	1
				20	0
				4	3
	甲殻類計		1,262	581	
節足動物	ウミグモ綱	ダニ目			1
	クモ形綱				2
	節足動物計			1,262	584
環形動物	多毛綱			3	12
棘皮動物	クモヒトデ綱			39	27
触手動物	苔虫綱			多数	多数
原生動物	根足虫綱	有孔虫目		多数	多数
ヒラクサ着生量 (1 m ²)				1,950 g	2,050 g

3 生物調査結果要約

1. 雌の抱卵率は57年5月25日には100%, 9月18日には0%, 58年9月7日には2.6%で、抱卵期は5月上旬～9月上旬と考えられる。
2. 黒潮と沿岸の間に分布した黒潮北縁に沿って本州沿岸を移送される最終期フィロゾマは、ブエルルスに変態後海流の影響を受けつつ泳いで浅海岩礁帯に到達するものと考えられる。
3. 伊豆大島波浮港内に採集器を設置しブエルルス・初期稚エビの採集を試みたが合計2尾の採捕に留まった。
4. 神津島・大島周辺でヒラクサを潜水採取し、このなかから57年にはブエルルス33尾・初期稚エビ21尾, 58年にはブエルルス193尾・初期稚エビ151尾合計398尾を得、ブエルルス・初期稚エビがヒラクサ中に生息することが判明した。
5. ブエルルス出現期は5月下旬から10月上～中旬, 盛期は8～9月である。
6. ブエルルスは水深10～16mで20m付近の1.36倍出現する。
7. 年間ブエルルス着定量を推定し、水深10～16mでは0.576尾/m², 水深20mでは0.424尾/m²という値を得た。
8. ブエルルス着定量の多かった4地点のうち, 3地点はほとんど外洋に面しており, 伊豆諸島においてはブエルルスは海洋線湾入部だけでなく外海域にも多数着定すると考えられる。
9. ヒラクサ中の稚エビは第Ⅰ期が最も多く第Ⅱ期以降は少ないため, ヒラクサ中でブエルルスから変態した稚エビはしばらくヒラクサ中に留った後次第にヒラクサ外へ移動していくものと考えられる。
10. 初期稚エビの期数は第1触角鞭状部節数と甲長から査定し得ると考えた。
11. 神津島で成エビの多い地形は2つのパターンに分けられ, 1つは崖あるいはケーソンの深い割れ目, もう1つはコンクリートブロック下部である。
12. 標識放流調査による最大移動距離は9Kmで, 牛鼻放流群についてみれば1.5Km以遠への移動は全体の14.6%であった。また祇苗島と本島間にある深さ50～60mの海峡を越えた両方向の移動が確認された。
13. 神津島各地先のイセエビ頭胸甲長を比較すると, 恩馳島は小型, 祇苗島は大型, 本島はその中間であったが, 特に若令群の多い地先は認められなかった。
14. 甲長範囲別の性比をみると甲長増加に伴って性比も増すが, 57年には7～8cm区画で, 58年には5～6cm区画で性比の一時的減少がみられた。
15. 漁獲の影響を受けていない神津島禁漁区27haの資源量は3.16tと推定された。
16. イセエビ刺網に羅網した魚類22種114尾の消化管内容物を調査した結果, ホウライヒ

メジの胃内容物から第Ⅲ期稚エビ1尾およびブエルルス1尾を発見した。

17. 第Ⅰ期稚エビ，成エビの胃内容物を調査した結果両者とも主餌料は巻貝類・甲殻類と考えられた。
18. 漁場造成予定地の岩礁域植物相をみると，浅部では石灰藻・タマイタダキ・キントキ等丈の低い藻が多く，水深10m付近からヒラクサが増えはじめ，20m付近では一面のヒラクサ場となる。
19. 観音浦沖砂地中の動物は貝類が最も多く，多毛類・ヨコエビ類がこれに次だ。
20. ヒラクサ中動物の洗い出しを行い，1m²中に腹足類2,472，甲殻類922，斧足類，クモヒトデ類，触手動物等多数の動物が出現し，これらは稚エビの胃内容とほぼ一致した。

4 生物調査引用文献

- 1) 椎野季雄：伊勢蝦の胚期発生に関する研究，三重大学水産学部紀要，1，(1950)。
- 2) 東京水試：イセエビ産卵調査，東京都水産試験場事業報告，昭和26年，107-111(1950)。
- 3) 五十嵐正治・永野初男：大島におけるイセエビの産卵について，東京水試調査研究要報Ⅲ，通刊№90，15-24(1955)。
- 4) Nakamura, S. : Ecological studies on the spiny lobster, *Panulirus japonicus*(V. Siebold), with special reference to its conservation. I. J. Imp. Fish. Inst., 34, 101-113(1940)。
- 5) 水産庁：昭和51年度大規模増殖場開発事業調査総合報告書Ⅱ，昭和52年。
- 6) 大島泰雄：イセエビの生態に関する二，三の点，水産学会報，8，231-238(1941)。
- 7) 高橋耿之介・斉藤芳樹：八丈島のイセエビ類，東京水試八丈分場，(プリント)(1966)。
- 8) 大島泰雄：イセエビ属のフィロゾマに就いて，水産学会報，9，36-44(1942)。
- 9) 井上正昭：イセエビフィロゾマの飼育に関する研究-I 形態について，日水誌，44，457-475(1978)。
- 10) Harada, E. : Ecological observation on the Japanese spiny lobster, *Panulirus japonicus*(Von Siebold), in its larval and adult life. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., VI, 99-120(1957)。
- 11) 中村和夫：徳島県沿岸で採集されたイセエビ属フィロゾマの採集場所・時期・体長について，栽培技研，3，105-112(1974)。
- 12) 野中忠・若林カルロス：本邦南西海域における1970年夏のPhyllosomaの分布につ

- いて、静水試研報、(6)、15-18(1973)。
- 13) 税所俊郎：イセエビ類幼生の沿岸定着機構に関する研究，昭和57年度科学研究費補助金（一般研究C）研究成果報告書 課題番号：56560210，昭和58年。
 - 14) Phillips, B. F., Brown, P. A., Rimmer, D. W., and Reid, D. D. :
Distribution and dispersal of the phyllosoma larvae of the western
rock lobster, *Panulirus cygnus*, in the south-eastern Indian Ocean.
Aust. J. Mar. Freshwater Res., 30, 773-783 (1979).
 - 15) Lewis, J. B. :The phyllosoma larvae of the spiny lobster *P. argus*.
Bull. Mar. Sci. Gulf Caribbean, 1, 89-103 (1951).
 - 16) Johnson, M. W. :Production and distribution of larvae of the
spiny lobster *Panulirus interruptus* (Randall) with records on
P. gracilis Streets. *Bull. Scripps Inst. Oceanogr., Univ. Calif.*,
7, 413-461 (1960).
 - 17) Phillips, B. F. :The circulation of the southeastern Indian
Ocean and the planktonic life of the western rock lobster.
Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 19, 11-39, (1981).
 - 18) Serfling, S. T., and Ford, R. F. :Ecological studies of the
puerulus larval stage of the California spiny lobster, *Panulirus*
interruptus. *Fish. Bull.*, 73, 360-377 (1975).
 - 19) 海上保安庁水路部：海洋速報，昭和58年15号・21号・22号，昭和58年。
 - 20) 丸茂隆三：海洋プランクトンの分布と生態に関する研究，日本海洋学会誌，36，126
-133(1980)。
 - 21) 渡部泰輔：マサバの発育初期における形態・生態ならびに資源変動に関する研究，東海水
研報，62，1~283(1970)。
 - 22) 藤本実・平野敏行：卵・稚仔輸送拡散機構としての黒潮の研究I，東海水研報，71,51
-68(1972)。
 - 23) Phillips, B. F., Rimmer, D. W., and Reid, D. D. :Ecological
investigations of the late-stage phyllosoma and puerulus larvae
of the western rock lobster *Panulirus longipes cygnus*. *Mar. Biol.*,
45, 347-357 (1978).
 - 24) Phillips, B. F., and Olsen, L. :Swimming behaviour of the puerulus

- larvae of the western rock lobster. Aust. J. mar. Freshwat. Res., 26, 415-417 (1975).
- 25) 税所俊郎：フィロゾマ幼生に関する海洋生物学的研究，鹿大水産紀要，15，177-239 (1966)。
- 26) Johnson, M. W. : The larval development of the California spiny lobster, *Panulirus interruptus* (Randall), with notes on *Panulirus gracilis* Streets. Proc. Calif. Acad. Sci. Ser., 29, 1-19 (1956)。
- 27) 木下虎一郎：伊勢蝦のPuerulus と其後の変体に就きて，動物学雑誌，46，391-399 (1934)。
- 28) 岡田弥一郎・久保伊津男：イセエビの研究VI プエルルス，稚蝦及び成蝦の比較，資源研彙報，15，41-46 (1950)。
- 29) 水産庁：昭和56年度大規模増殖場開発事業調査総合報告書，昭和57年。
- 30) 金盛浩吉・金丸誠司：熊野周辺海域におけるイセエビ資源生態の研究，昭和54年度和歌山水試事業報告 (1980)。
- 31) Phillips, B. F. : A semi-quantitative collector of the western rock lobster *Panulirus cygnus* George (Decapoda, Palinuridae). Crustaceana, 22, 147-154 (1970)。
- 32) 東京水試：昭和57年度大規模増殖場開発事業調査報告書，昭和58年。
- 33) 野中忠：漁獲に表われたイセエビ資源の性状，静岡水試研報，16，31-42 (1982)。
- 34) 岡田弥一郎・久保伊津男：イセエビの研究V，プエルルス及び稚蝦に就いて1，資源研彙報，12，20-24 (1948)。
- 35) 道津喜衛・吉村安仁・乾輝男：五島列島のイセエビ生態調査(1)，海洋と生物，5，242-246 (1983)。
- 36) 中沢毅一：伊勢蝦の変態研究附幼虫の生態に関する所見，動雑，29，259-267 (1917)。
- 37) 道津喜衛・耕田隆彦・吉村安仁：五島列島のイセエビ生態調査(2)，海洋と生物，5，322-327 (1983)。
- 38) Chittleborough, R. G. : Environmental factors affecting growth and survival of juvenile western rock lobsters *Panulirus longipes*.

- Aust. J. mar. Freshwater Res. , 26, 177-196(1975).
- 39) 大島泰雄：イセエビの棲所に就いて，養殖会誌，5，75～83(1935)。
- 40) Takagi, K.: Migration of the tagging spiny lobster, *Panulirus japonicus*, on the southern Boso Peninsula, Chiba prefecture : a continuous experiment, 1951-1968. La mer, 10, 95-112 (1972).
- 41) 水産庁：昭和57年度大規模増殖場開発事業調査総合報告書，昭和58年。
- 42) 中村秀也：龍蝦の食性に就て，養殖会誌，8，87-96(1938)。
- 43) 東京水試：神津島恩馳漁場調査，東京水試調査研究要報IV，昭和31年。

C 施設試験

(目的)

イセエビプエルスの定着量増加と稚エビ期の生残率上昇のためには，それらの定着基盤・餌場・すみ場・かくれ場造成が有効であると考えられ，また若令エビや成エビについてもそれらの多数集する天然地形が存在することから，すみ場所の重要性が認識される。生物調査の結果から，プエルス・初期稚エビはヒラクサ場に多数生息し，また，成エビは岩の深い割れ目やブロック下部に集することが明らかになった。これらのすみ場造成とその結果を調べるため試験礁を設置した。

(方法)

神津島周辺3カ所(図62)に図63～66の礁を投入・設置した。

図62 試験礁投入位置

試験礁を設置した禁漁区は島の西側に位置し、投入水深は20m、ハシルマ沖は水深15mで沖側は砂地、岸側は岩礁帯となっている。観音浦は水深23m、砂地主体であるが根石もみられる。

1) 鉄枠型

礁型は図63に示すとおりで、割石と割石の間のできる複雑な空間が稚エビ・若令エビ・成エビのすみ場所となることをねらっている。詰石の大きさは一様でないが、20個の縦・横・高さを最大部で測定した結果、最も大きいもので60×40×40cm、最も小さいもので23×5×17cmであった。鉄枠中の上部には、波浪による石の流出を防ぐためスクリーン材が溶接されている。投入個数は、禁漁区2基、ハシルマ沖13基、観音浦沖13基、合計28基である。

2) 蛇籠

F R P製の籠に割石を詰めたもので(図64)割石間への稚エビ・成エビすみ付きとF R P枠へのヒラクサ着生状況を調査する。ハシルマ沖に2基設置した。

3) F R P箱型石詰礁

図66に礁型を示す。ハシルマ沖に1基設置した。

4) コンクリートブロック

礁型は図65に示すとおりで、若令エビ・成エビのすみ場造成が主たる目的であるが、ヒラクサ着生基盤としての効果についても検討する。投入個数は、禁漁区2基、ハシルマ沖1基、観音浦1基である。

5) 投石

自然石を枠に入れずそのまま投入し積重ねる。5m³をハシルマ沖に投入した。

図63 鉄枠型礁

図 6 4 蛇 籠

図 6 5 コ ン ク リ ー ト 礁

図 6 6 F R P 箱 型 石 詰 礁

上部はFRP枠に石詰，下部はコンクリート

設置した試験礁の沈設状況，イセエビ生息状況，海藻・動物生息状況を58年中に8回潜水調査した。

(結果および考察)

1) 観音浦

投入地点の海底は砂地帯で，所々に径1～2mの根石がみられる。砂地上の鉄枠礁の多くは埋没し，最も埋没の激しい礁では約3/4が砂中に潜り，礁として機能していなかった。投入4ヵ月後に当る最初の調査時には既に埋没はかなり進行しており，その後の調査では若干の沈下が認められるに留まっていることから，礁の埋没は投入後すみやかに起るものと思われる。イセエビ生息状況は外部からの観察によるのみ調査したが，イセエビは確認できなかった。

コンクリート礁は根石の上に投入されたため埋没は起っていないが、イセエビは確認できなかった。海藻は両礁とも6月には多種類の着生がみられたが、9月にはタマイタダキ・アオサ・シマオウギ等数種しか着生していなかった。

2) ハシルマ

投入地点は転石帯で礁の埋没は起っていない。イセエビは外部からの観察で8月に鉄枠礁から1尾を確認したに留った。

鉄枠礁への海藻着生量は季節によって異なるが、投入後1年を経過していないため周辺岩礁より着生量は少なかった。着生種はカギケノリ・タマイタダキ・アオサ・シマオウギ等でヒラクサはみられず、また外側の鉄枠より中詰自然石に着生量が多かった。

コンクリート礁は上面平坦部への海藻着生量が少なく、夏季にはアオサ類がみられるものの秋期にはほとんど着生していない。

F R P箱型石詰礁、蛇籠にはウツボ・イタチウオ・カサゴ・ギンタカハマ等の動物がみられ海藻着生状況は鉄枠型とほぼ同じであった。

割石の積上げについてみると、投入量が少なかったためか石は積上らず平坦に沈設している。海藻では葉長10cm程のタマイタダキが普通にみられ、鉄枠礁と比較しても着生量が多い。岩間にイセエビはみられなかったが、岩間の空隙はイセエビ生息に適しているように思われた。

3) 禁漁区湯柱

投入地点の海底は砂地と岩盤帯であるが砂層はうすく、礁の埋没は若干認められるだけであった。周辺は平坦でイセエビのすみ場所は皆無である。コンクリート礁・鉄枠礁ともイセエビは確認できなかったが、恐らく礁が単体として互にかなり離れて設置され、岸側岩礁域からも距離があることによるものと思われる。

以上のように試験礁追跡によって確認できたイセエビは非常に少なかったが、この原因として、調査が外部からの目視観察によって行われたため石詰の内部に隠れるエビは発見できないこと、礁が砂中に埋没して機能がそこなわれたこと、投入後経過時間が短かく海藻量・付着動物量が不足しかくれ場・餌場としての機能が十分でなかったこと、投入地点が砂地や岩盤でしかも単体として設置されるものが多かったため周辺からエビの移入が起りにくかったこと等をあげることができよう。

IX 造成に当たりの基本的な考え方

A 造成位置の選定理由

1 社会的条件

イセエビは、当地区の磯根資源として重要な位置を占めており、漁業資源の中でも資源管理を十分に行なえば、最も安定した収益が確保されるものである。

当事業予定海域は、神津島周辺で唯一残された未開発海域であり、関係漁業協同組合の組合員からも、長年にわたって開発に関する強い期待がよせられている。

2 物理条件

神津島を中心とした伊豆諸島海域は黒潮の影響を強く受けている。造成海域でもその分支流が、等深線に平行な北流として卓越している。

この北流によって、変態期に近いフィロゾマ、およびプエルルスが多数移入されている。

また、当造成海域は、プエルルス、稚エビ、成エビの最適生息水深である10～30m帯が主体となっている。

当造成海域の底質は、一部岩礁帯があるものの、大部分が転石および砂質帯である。

3 生物条件

海藻類の繁茂が幼稚仔にとって餌料や棲息場の供給さらに害敵からの保護という点で重要な意味がある。

神津島周辺には、ヒラクサを中心とした藻場が多数存在しているため、着底基質を与えることにより、孢子、幼生の着底をはかることが可能である。

当造成海域の流速は24cm/sec以下が75%を占め、全般的に流れが速いがプエルルスには最大46cm/secの遊泳速度があるという報告²⁴⁾もあり、強い遊泳力を持っているので、自力で着底基質への到達が可能である。

B 造成手法の考え方

1 基本的な考え方

大規模増殖場造成事業は、基本的に対象生物の幼稚仔(プエルルス)の集積、着底を促進し保護育成を図り、その後の生残率を高めることにより、地区のイセエビ資源の補給を増し、資源の増大さらに漁獲量の増加をもたらすものである。

イセエビ幼稚仔の集積及び着底に関する知見は多くないが、日本の沿岸でふ化したフィロゾマ幼生は、遊泳力が弱く、しかも浮遊期間が長いため、黒潮と沿岸流との複雑な渦流によって形成される流況によって太平洋沿岸域に巾広く移送される可能性が強いとしている。

このフィロゾマ幼生は約10ヶ月でプエルルス幼生に変態し、方向性を持って泳ぐことが

できるようになり、その遊泳力はオーストラリアの研究結果によると30 cm/sec前後であり最高46 cm/secで移動する個体も確認されている。

当地区は黒潮流路に当るため、概して流速は早い(最大96 cm/sec)が、今回の調査結果からも当地区におけるプエルルス幼生の分布は、顕著な湾入部のみならず、流れの速い外海域のヒラкса中に、多数出現していることからみても、プエルルス幼生は海流の影響は受けるものの自ら泳いで沿岸域に到達、集積し、海藻中に着底するものと推測できる。

また、海藻中に着底したプエルルス幼生や稚エビの生残に関する知見も多くはないが、生残に係わる要因として、餌料害敵、棲場などが考えられる。プエルルスが調査水域のヒラкса場に多数出現していること等から、海藻類の繁茂が幼稚仔にとって餌料や棲場の供給さらには害敵からの保護という点で重要な意味があるものと思慮される。

島しょ地域各島の漁港、港湾の防波堤の基礎石や消波ブロックが各地先においてイセエビの生息密度が高い漁場となっていること、全国における海中構築物周辺がイセエビの優れた棲場を形成していることは、ここにおける幼稚仔の生残も高いことが推測できるし、適当な構築物を設置することによりイセエビの増殖を図ることが可能と考えられる。

これらのことから、増殖場において着底した幼稚仔の生残を高めるためには、自然石やブロック等によって、イセエビの棲場となる間隙をもった構造物を設置することと海藻が繁茂する場造りが条件と考えられる。

また、プエルルスの分布は集積密度の差はあっても浅場、深場、ともに分布していること、さらに成エビについても同様であることからみると、特に保護育成場と着底場を区別することなく漁場造成の基本は各漁場共、幼稚仔の着底、成エビの棲息も可能となるものとする。

2 選定位置の環境の現状

環境要素	現 況	改善の要否
水域の広さ	漁場造成海域は神津島北東部の観音浦～成沢に至る水深0～40 mまでの150ヘクタールの水域である。	要
水深	水深25 mまでは岩礁域で起伏の激しい凸凹地形を呈しているが、25 m以深はゆるやかに傾斜しており平坦な地形となっている。また、観音浦南部には作根、岡作根の岩礁域があり、本島との間に鞍部を形成しており、北西部の水深40 m前後には比高2～5 mのサンドウェーブ地形がみられる。	
底質	当海域の底質は沿岸部では岩が分布しており、沖合域は中粗砂が主に分布する。また水深25 m以浅は主に砂礫帯で大型転石が多数点在し	

	ており、一部に礫が混入する。	
流 れ	造成海域の流況は、海岸に平行した南北方向の流れが基本となるが、北向きの恒流成分が大きいため、表層では北流が全体の62.3～74.7%を占め卓越流となる。しかし、底層では北東流、南東流が増加して北流は41.4%を占めている。また、最大流速は表層で96cm/sec、底層で61cm/secと早い、24cm/sec以下の流れが全体の75%を占めている。	否
水 質	神津島周辺における月平均の塩分量は34.04‰～34.77‰で、典型的な黒潮表層水の性状を示している。	否
静 穏 度	運輸省第2港湾建設局が大島波浮港外に設置した波高計の記録によると、昭和48年～56年に発生した異常波浪のうち最大の波は、昭和56年の台風15号接近時に $H1/3 = 8.41\text{ m}$ 、 $T1/3 = 1.11\text{ sec}$ 、台風24号接近時に $H1/3 = 9.87\text{ m}$ 、 $T1/3 = 1.02\text{ sec}$ が記録されている。	否
餌 料	神津島におけるプエルルス、稚エビの定着場、棲場となっているヒラクサ場の動物相を調査したところ1㎡中に腹足類2472個体、甲殻類922個体、斧足類、クモヒトデ類、触手動物、原生動物等多数の動物が出現し、これは第I期稚エビの胃内容とほぼ一致した。また、砂地中の動物は貝類(微小貝、幼貝主体)が最も多く、多毛類、ヨコエビ類がこれに次いだ。	要
利用環境	神津島の距岸2000m内には、第1種・第2種共同漁業権が設定されており、イセエビの採捕については東京都漁業調整規則によるほか、漁業協同組合の漁業権行使規則により行使されており、漁期、体長、漁具漁法については下記のとおり制限されている。 漁期については、このほか理事会で海況により毎年各地先ごとに口開け、口止めを取り決め操業期間を決定しており、体長についても都の調整規則より厳しい体長制限(15cm)や、制限以下のイセエビを採捕した場合の再放流等の資源管理体制を作っている。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 禁止期間 6月1日～9月30日 ・ 体長制限 15cm ・ 漁具・漁法 刺網以外制限 	要

C 具体的な造成手法

大規模増殖場造成の具体的な手法として、調査結果にみられたようにヒラクサ場がプエルルス集積場所となっていること、ヒラクサ場で変態した稚エビはしばらく場に滞った後、次第に周辺の岩礁帯に移動していくこと、ヒラクサ場と岩礁帯間の移動は当オエビについても起っていることや、成長した段階での棲息場は小穴、亀裂、逃避に要する奥部への間隙が必要で、複雑な間隙が形成されるほど棲み場としての利用効率が良いようであること等からプエルルスの着底、集積場及び餌料供給の場としてのヒラクサ場造成と、初期稚エビ若令エビへと連なる造礁計画がより効果的な方法と判断される。

一方島しょ地域は台風の襲来が多いところでもあり、波浪は厳しいため碎波帯より以深の水深を考慮し、かつ既ヒラクサ場の形成状況から漁場造成水深を15m線を中心として10～30m水深の水域とした。

底質については岩盤地帯、転石地帯、砂礫地帯の三区分別とする。岩盤、転石地帯は起伏が激しいものの岩の表面が滑らかで、プエルルスの着底に必要なヒラクサの着生は岩の上部にしかみられず、イセエビの棲息に適した亀裂等もない。

また、砂礫地帯は、ゆるやかに傾斜しており平坦な地形となっているが、プエルルスの着底に必要な基質はない。そのため、各地帯区分とも投石をベースとしたプエルルスの着底場、餌料供給場となるヒラクサ場の造成と、イセエビの棲場となる間隙をもった構造物を組み合わせる構成とする。

初期稚エビ～成エビまで一連の棲場造成については、イセエビ幼生群の成長に伴う移動可能距離を考慮して施設を配置することとし、隣接する造成漁場並びに周辺天然漁場への資源添加を図る。

プエルルスは強い遊泳力をもっており(18, 24, 25) 海流の影響はうけるものの自ら泳いで着底すると考えられることや、今回の調査結果から当地区のプエルルスの分布は分散型であると推定できる。そのため、施設の形状は投石を主体とし高さよりも平面的な広がりをもった構造を基本とする。

施設の全体配置については、岩盤地帯2ブロック(42群)転石地帯3ブロック(48群)、砂礫地帯3ブロック(64群)、計8ブロック(154群)を設定し、現状の環境中、水深、底質、餌料等の問題を改善するため、それぞれの地帯区分に適合した各種施設を組み合わせる構成を行なう。

各ブロックとも、20m四方の範囲に幼生着底礁、育成礁を9基設置したものを1群とし、礁の間隙については今回の調査結果並びに試験礁の調査結果から4m以内とした。

また、各群の間隙についても若令エビ、成エビの移動調査結果をもとに30 mとし、岩盤、転石地帯に連続するように設置することにより、広範囲なプエルルスに着底が可能となり、かつ周辺天然漁場への資源の添加が促進される配置とする。

図 6 7 大規模増殖場造成事業計画平面図

A.....プエレルス着定礁・稚エビ保護礁

B.....成エビ礁

Publication of The Tokyo Metropolitan

Fisheries Experiment Station № 3 2 6

Memoir of The Tokyo Metropolitan

Fisheries Experiment Station № 1 7 2

昭和57・58年度

印刷物規格表第2類

印刷番号(58)2582

大規模増殖場開発事業調査報告書
(イセエビ)

昭和59月3月

編集・発行 東京都水産試験場技術管理部
〒125 東京都葛飾区水元公園1-1
電話 03-600-2873

印刷会社名 原口印刷株式会社
東京都千代田区猿樂町1-5-19
電話 03-291-8819